

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 989 | 427 | 562 | 263 | 296 | 164 | 266 |
| | 55-59 ans | 960 | 413 | 547 | 53 | 76 | 360 | 471 |
| | 60-64 ans | 1 279 | 554 | 725 | 82 | 88 | 472 | 637 |
| | 65-69 ans | 1 477 | 675 | 802 | 81 | 71 | 594 | 731 |
| | 70-74 ans | 1 165 | 525 | 640 | 51 | 39 | 474 | 601 |
| | 50-74 ans | 5 870 | 2 594 | 3 276 | 530 | 570 | 2 064 | 2 706 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 54 | 24 | 30 | 14 | 10 | 10 | 20 |
| | 55-59 ans | 40 | 18 | 22 | 5 | 2 | 13 | 20 |
| | 60-64 ans | 57 | 23 | 34 | 6 | 4 | 17 | 30 |
| | 65-69 ans | 63 | 26 | 37 | 1 | 2 | 25 | 35 |
| | 70-74 ans | 74 | 33 | 41 | 5 | 3 | 28 | 38 |
| | 50-74 ans | 288 | 124 | 164 | 31 | 21 | 93 | 143 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 40 | 18 | 22 | 10 | 7 | 8 | 15 |
| | 55-59 ans | 34 | 14 | 20 | 2 | 1 | 12 | 19 |
| | 60-64 ans | 45 | 19 | 26 | 3 | 2 | 16 | 24 |
| | 65-69 ans | 50 | 23 | 27 | 0 | 1 | 23 | 26 |
| | 70-74 ans | 50 | 20 | 30 | 2 | 1 | 18 | 29 |
| | 50-74 ans | 219 | 94 | 125 | 17 | 12 | 77 | 113 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 14 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| | 65-69 ans | 13 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| | 70-74 ans | 24 | 13 | 11 | 3 | 2 | 10 | 9 |
| | 50-74 ans | 69 | 30 | 39 | 14 | 9 | 16 | 30 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 975 | 421 | 554 | 259 | 293 | 162 | 261 |
| | 55-59 ans | 954 | 409 | 545 | 50 | 75 | 359 | 470 |
| | 60-64 ans | 1 267 | 550 | 717 | 79 | 86 | 471 | 631 |
| | 65-69 ans | 1 464 | 672 | 792 | 80 | 70 | 592 | 722 |
| | 70-74 ans | 1 141 | 512 | 629 | 48 | 37 | 464 | 592 |
| | 50-74 ans | 5 801 | 2 564 | 3 237 | 516 | 561 | 2 048 | 2 676 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 43 | 30 | 13 | 18 | 10 | 12 | 3 |
| | 55-59 ans | 48 | 28 | 20 | 4 | 4 | 24 | 16 |
| | 60-64 ans | 58 | 31 | 27 | 4 | 3 | 27 | 24 |
| | 65-69 ans | 62 | 41 | 21 | 8 | 1 | 33 | 20 |
| | 70-74 ans | 59 | 36 | 23 | 5 | 2 | 31 | 21 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 270 | 166 | 104 | 39 | 20 | 127 | 84 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 43 | 30 | 13 | 18 | 10 | 12 | 3 |
| | 55-59 ans | 48 | 28 | 20 | 4 | 4 | 24 | 16 |
| | 60-64 ans | 58 | 31 | 27 | 4 | 3 | 27 | 24 |
| | 65-69 ans | 62 | 41 | 21 | 8 | 1 | 33 | 20 |
| | 70-74 ans | 59 | 36 | 23 | 5 | 2 | 31 | 21 |
| | 50-74 ans | 270 | 166 | 104 | 39 | 20 | 127 | 84 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 32 | 22 | 10 | 12 | 8 | 10 | 2 |
| | 55-59 ans | 45 | 26 | 19 | 4 | 4 | 22 | 15 |
| | 60-64 ans | 50 | 25 | 25 | 3 | 3 | 22 | 22 |
| | 65-69 ans | 59 | 39 | 20 | 7 | 1 | 32 | 19 |
| | 70-74 ans | 50 | 29 | 21 | 3 | 1 | 26 | 20 |
| | 50-74 ans | 236 | 141 | 95 | 29 | 17 | 112 | 78 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 26 | 16 | 10 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| | 55-59 ans | 34 | 21 | 13 | 3 | 2 | 18 | 11 |
| | 60-64 ans | 36 | 17 | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 |
| | 65-69 ans | 48 | 35 | 13 | 7 | 1 | 28 | 12 |
| | 70-74 ans | 36 | 20 | 16 | 2 | 1 | 18 | 15 |
| | 50-74 ans | 180 | 109 | 71 | 21 | 14 | 88 | 57 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 30 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Age | Hommes | | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| | 55-59 ans | 45 | 26 | 19 | 4 | 4 | 22 | 15 |
| | 60-64 ans | 48 | 24 | 24 | 3 | 3 | 21 | 21 |
| | 65-69 ans | 58 | 39 | 19 | 7 | 1 | 32 | 18 |
| | 70-74 ans | 47 | 26 | 21 | 3 | 1 | 23 | 20 |
| | 50-74 ans | 228 | 135 | 93 | 27 | 17 | 108 | 76 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 50-74 ans | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 31 | 21 | 10 | 11 | 8 | 10 | 2 |
| | 55-59 ans | 42 | 23 | 19 | 3 | 4 | 20 | 15 |
| | 60-64 ans | 48 | 23 | 25 | 3 | 3 | 20 | 22 |
| | 65-69 ans | 58 | 39 | 19 | 7 | 1 | 32 | 18 |
| | 70-74 ans | 47 | 28 | 19 | 3 | 1 | 25 | 18 |
| | 50-74 ans | 226 | 134 | 92 | 27 | 17 | 107 | 75 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 32 | 22 | 10 | 12 | 8 | 10 | 2 |
| | 55-59 ans | 45 | 26 | 19 | 4 | 4 | 22 | 15 |
| | 60-64 ans | 50 | 25 | 25 | 3 | 3 | 22 | 22 |
| | 65-69 ans | 59 | 39 | 20 | 7 | 1 | 32 | 19 |
| | 70-74 ans | 52 | 30 | 22 | 3 | 2 | 27 | 20 |
| | 50-74 ans | 238 | 142 | 96 | 29 | 18 | 113 | 78 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 14 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| | 55-59 ans | 19 | 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| | 60-64 ans | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| | 65-69 ans | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| | 70-74 ans | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| 50-74 ans | 77 | 37 | 40 | 10 | 10 | 27 | 30 | |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 50-74 ans | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 55-59 ans | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| 60-64 ans | 13 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 65-69 ans | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | |
| 70-74 ans | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 50-74 ans | 49 | 32 | 17 | 6 | 3 | 26 | 14 | |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| 55-59 ans | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 60-64 ans | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | |
| 65-69 ans | 17 | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
| 70-74 ans | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
| 50-74 ans | 65 | 41 | 24 | 8 | 2 | 33 | 22 | |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 65-69 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| | 50-74 ans | 18 | 11 | 7 | 0 | 1 | 11 | 6 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 15 | 13 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| | 55-59 ans | 19 | 13 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 |
| | 60-64 ans | 28 | 16 | 12 | 2 | 2 | 14 | 10 |
| | 65-69 ans | 31 | 22 | 9 | 4 | 0 | 18 | 9 |
| | 70-74 ans | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| | 50-74 ans | 117 | 76 | 41 | 15 | 5 | 61 | 36 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| | 55-59 ans | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| | 60-64 ans | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| | 65-69 ans | 17 | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 6 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| | 50-74 ans | 65 | 41 | 24 | 8 | 2 | 33 | 22 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| | 55-59 ans | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| | 60-64 ans | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| | 65-69 ans | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| | 70-74 ans | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| | 50-74 ans | 53 | 37 | 16 | 7 | 2 | 30 | 14 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| | 55-59 ans | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| | 60-64 ans | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| | 65-69 ans | 19 | 14 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 |
| | 70-74 ans | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| | 50-74 ans | 69 | 49 | 20 | 9 | 2 | 40 | 18 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 70-74 ans | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| | 50-74 ans | 18 | 11 | 7 | 0 | 1 | 11 | 6 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| | 50-74 ans | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|----------|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Age | Hommes | | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 50-74 ans | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|----------|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Age | Hommes | | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 50-74 ans | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 5,5 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 3,4 | 6,1 | 7,5 |
| | 55-59 ans | 4,2 | 4,4 | 4 | 9,4 | 2,6 | 3,6 | 4,2 |
| | 60-64 ans | 4,5 | 4,2 | 4,7 | 7,3 | 4,5 | 3,6 | 4,7 |
| | 65-69 ans | 4,3 | 3,9 | 4,6 | 1,2 | 2,8 | 4,2 | 4,8 |
| | 70-74 ans | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 9,8 | 7,7 | 5,9 | 6,3 |
| | 50-74 ans | 4,9 | 4,8 | 5 | 5,8 | 3,7 | 4,5 | 5,3 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1 | 1,2 | 1,9 |
| | 55-59 ans | 0,6 | 1 | 0,4 | 5,7 | 1,3 | 0,3 | 0,2 |
| | 60-64 ans | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 3,7 | 2,3 | 0,2 | 0,9 |
| | 65-69 ans | 0,9 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 0,3 | 1,2 |
| | 70-74 ans | 2,1 | 2,5 | 1,7 | 5,9 | 5,1 | 2,1 | 1,5 |
| | 50-74 ans | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,6 | 1,6 | 0,8 | 1,1 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 74,1 | 75 | 73,3 | 71,4 | 70 | 80 | 75 |
| | 55-59 ans | 85 | 77,8 | 90,9 | 40 | 50 | 92,3 | 95 |
| | 60-64 ans | 78,9 | 82,6 | 76,5 | 50 | 50 | 94,1 | 80 |
| | 65-69 ans | 79,4 | 88,5 | 73 | 0 | 50 | 92 | 74,3 |
| | 70-74 ans | 67,6 | 60,6 | 73,2 | 40 | 33,3 | 64,3 | 76,3 |
| | 50-74 ans | 76 | 75,8 | 76,2 | 54,8 | 57,1 | 82,8 | 79 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 4,4 | 7,1 | 2,3 | 6,9 | 3,4 | 7,4 | 1,1 |
| | 55-59 ans | 5 | 6,8 | 3,7 | 8 | 5,3 | 6,7 | 3,4 |
| | 60-64 ans | 4,6 | 5,6 | 3,8 | 5,1 | 3,5 | 5,7 | 3,8 |
| | 65-69 ans | 4,2 | 6,1 | 2,7 | 10 | 1,4 | 5,6 | 2,8 |
| | 70-74 ans | 5,2 | 7 | 3,7 | 10,4 | 5,4 | 6,7 | 3,5 |
| | 50-74 ans | 4,7 | 6,5 | 3,2 | 7,6 | 3,6 | 6,2 | 3,1 |
| 50-74 ans ** | 4,8 | 6,6 | 3,2 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 74,4 | 73,3 | 76,9 | 66,7 | 80 | 83,3 | 66,7 |
| | 55-59 ans | 93,8 | 92,9 | 95 | 100 | 100 | 91,7 | 93,8 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 86,2 | 80,6 | 92,6 | 75 | 100 | 81,5 | 91,7 |
| | 65-69 ans | 95,2 | 95,1 | 95,2 | 87,5 | 100 | 97 | 95 |
| | 70-74 ans | 84,7 | 80,6 | 91,3 | 60 | 50 | 83,9 | 95,2 |
| | 50-74 ans | 87,4 | 84,9 | 91,3 | 74,4 | 85 | 88,2 | 92,9 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 81,3 | 72,7 | 100 | 58,3 | 100 | 90 | 100 |
| | 55-59 ans | 75,6 | 80,8 | 68,4 | 75 | 50 | 81,8 | 73,3 |
| | 60-64 ans | 72 | 68 | 76 | 66,7 | 66,7 | 68,2 | 77,3 |
| | 65-69 ans | 81,4 | 89,7 | 65 | 100 | 100 | 87,5 | 63,2 |
| | 70-74 ans | 72 | 69 | 76,2 | 66,7 | 100 | 69,2 | 75 |
| | 50-74 ans | 76,3 | 77,3 | 74,7 | 72,4 | 82,4 | 78,6 | 73,1 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 55-59 ans | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| | 60-64 ans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 65-69 ans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 70-74 ans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 50-74 ans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 2 (2-5) | 2 (2-5) | 2 (2-4) | 2 (2-5) | 3 (2-5) | 2 (2-5) | 2 (2-4) |
| | 55-59 ans | 2 (2-4) | 2 (2-5) | 2 (2-4) | 2 (2-3) | 3 (2-4,5) | 2 (2-5) | 2 (2-4) |
| | 60-64 ans | 2 (2-4) | 2 (2-5) | 2 (2-4) | 2 (2-5) | 3 (2-6) | 2 (2-5) | 2 (2-4) |
| | 65-69 ans | 2 (2-5) | 2 (2-5) | 2 (2-5) | 2 (2-4) | 3 (2-5) | 2 (2-5) | 2 (2-5) |
| | 70-74 ans | 2 (2-5) | 3 (2-5) | 2 (2-5) | 3 (2-5) | 2 (2-5) | 2 (2-5) | 2 (2-5) |
| | 50-74 ans | 2 (2-5) | 2 (2-5) | 2 (2-5) | 2 (2-5) | 3 (2-5) | 2 (2-5) | 2 (2-4) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 87 | 70 | 118 | 77 | 122 | 64 | 100 |
| | 55-59 ans | 80 | 84 | 74 | 85 | 71 | 84 | 75 |
| | 60-64 ans | 76 | 68 | 84 | 59 | 94 | 69 | 82 |
| | 65-69 ans | 101 | 108 | 83 | 90 | 74 | 113 | 83 |
| | 70-74 ans | 90 | 89 | 91 | 84 | 31 | 90 | 94 |
| | 50-74 ans | 88 | 88 | 88 | 81 | 99 | 90 | 85 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 72 (53-91) | 70 (52-89) | 87 (53-138) | 75 (63-91) | 87 (45,5-120) | 60 (47-80) | 100 (62-138) |
| | 55-59 ans | 75 (60-94) | 68 (62-110) | 75 (53-83) | 74,5 (61,5-107,5) | 75 (45-93) | 68 (62-110) | 75 (55-82) |
| | 60-64 ans | 72 (62,5-86,5) | 69 (45-75) | 77 (69-103) | 58,5 (40-77) | 90 (69-123) | 69 (58-74) | 75,5 (67-103) |
| | 65-69 ans | 89 (61-122) | 101 (62-133) | 88 (60-94) | 78 (68-103) | 74 (74-74) | 102 (61-133) | 88,5 (58-101) |
| | 70-74 ans | 82,5 (55,5-110) | 87,5 (60-124) | 72,5 (45-95) | 86 (38-128) | 31 (31-31) | 89 (60-124) | 81 (54-95) |
| | 50-74 ans | 75 (60-103) | 74 (60-104) | 76,5 (56-98) | 77,5 (63-96) | 79,5 (49-96,5) | 74 (60-114) | 76,5 (60-98) |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 2,3 | 3,3 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 50-74 ans | 0,4 | 0,6 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 96,9 | 95,5 | 100 | 91,7 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 93,3 | 88,5 | 100 | 75 | 100 | 90,9 | 100 |
| | 60-64 ans | 96 | 92 | 100 | 100 | 100 | 90,9 | 100 |
| | 65-69 ans | 98,3 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 94,7 |
| | 70-74 ans | 94 | 96,6 | 90,5 | 100 | 100 | 96,2 | 90 |
| | 50-74 ans | 95,8 | 95 | 96,8 | 93,1 | 100 | 95,5 | 96,2 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 43,8 | 31,8 | 70 | 33,3 | 75 | 30 | 50 |
| | 55-59 ans | 42,2 | 34,6 | 52,6 | 50 | 25 | 31,8 | 60 |
| | 60-64 ans | 30 | 16 | 44 | 33,3 | 33,3 | 13,6 | 45,5 |
| | 65-69 ans | 28,8 | 25,6 | 35 | 28,6 | 100 | 25 | 31,6 |
| | 70-74 ans | 23,1 | 23,3 | 22,7 | 33,3 | 50 | 22,2 | 20 |
| | 50-74 ans | 32,4 | 26,1 | 41,7 | 34,5 | 55,6 | 23,9 | 38,5 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 |
| | 65-69 ans | 3,4 | 2,6 | 5 | 0 | 0 | 3,1 | 5,3 |
| | 70-74 ans | 5,8 | 6,7 | 4,5 | 0 | 0 | 7,4 | 5 |
| | 50-74 ans | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 0 | 0 | 3,5 | 2,6 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 12,5 | 18,2 | 0 | 16,7 | 0 | 20 | 0 |
| | 55-59 ans | 20 | 26,9 | 10,5 | 0 | 25 | 31,8 | 6,7 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 26 | 24 | 28 | 33,3 | 66,7 | 22,7 | 22,7 |
| | 65-69 ans | 23,7 | 28,2 | 15 | 28,6 | 0 | 28,1 | 15,8 |
| | 70-74 ans | 17,3 | 13,3 | 22,7 | 33,3 | 0 | 11,1 | 25 |
| | 50-74 ans | 20,6 | 22,5 | 17,7 | 20,7 | 16,7 | 23 | 17,9 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 28,1 | 31,8 | 20 | 33,3 | 12,5 | 30 | 50 |
| | 55-59 ans | 22,2 | 23,1 | 21,1 | 25 | 25 | 22,7 | 20 |
| | 60-64 ans | 28 | 36 | 20 | 33,3 | 0 | 36,4 | 22,7 |
| | 65-69 ans | 28,8 | 28,2 | 30 | 28,6 | 0 | 28,1 | 31,6 |
| | 70-74 ans | 28,8 | 26,7 | 31,8 | 0 | 0 | 29,6 | 35 |
| | 50-74 ans | 27,3 | 28,9 | 25 | 27,6 | 11,1 | 29,2 | 28,2 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 6,3 | 4,5 | 10 | 0 | 12,5 | 10 | 0 |
| | 55-59 ans | 4,4 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 13,3 |
| | 60-64 ans | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| | 65-69 ans | 8,5 | 7,7 | 10 | 0 | 0 | 9,4 | 10,5 |
| | 70-74 ans | 13,5 | 20 | 4,5 | 0 | 0 | 22,2 | 5 |
| | 50-74 ans | 7,6 | 7,7 | 7,3 | 0 | 5,6 | 9,7 | 7,7 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 6,3 | 9,1 | 0 | 8,3 | 0 | 10 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,2 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 |
| | 60-64 ans | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9,1 | 4,5 |
| | 65-69 ans | 5,1 | 7,7 | 0 | 14,3 | 0 | 6,3 | 0 |
| | 70-74 ans | 3,8 | 6,7 | 0 | 33,3 | 0 | 3,7 | 0 |
| | 50-74 ans | 4,6 | 7 | 1 | 10,3 | 0 | 6,2 | 1,3 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 3,1 | 4,5 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 8,9 | 11,5 | 5,3 | 25 | 25 | 9,1 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9,1 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 1,7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5,3 |
| | 70-74 ans | 7,7 | 3,3 | 13,6 | 0 | 50 | 10 |
| | 50-74 ans | 5 | 4,9 | 5,2 | 6,9 | 11,1 | 3,8 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 15,4 | 30,9 | 3,6 | 27 | 3,4 | 3,8 |
| | 55-59 ans | 19,9 | 31,8 | 11 | 20 | 26,7 | 8,5 |
| | 60-64 ans | 22,1 | 29,1 | 16,7 | 25,3 | 23,3 | 15,8 |
| | 65-69 ans | 21,2 | 32,7 | 11,4 | 50 | 0 | 12,5 |
| | 70-74 ans | 21 | 23,4 | 19,1 | 20,8 | 0 | 20,3 |
| | 50-74 ans | 20,2 | 29,6 | 12,7 | 29,1 | 8,9 | 13,5 |
| | 50-74 ans ** | 20,5 | 30 | 11,7 | - | - | - |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 9,2 | 16,6 | 3,6 | 15,4 | 3,4 | 3,8 |
| | 55-59 ans | 10,5 | 14,7 | 7,3 | 20 | 13,3 | 6,4 |
| | 60-64 ans | 11 | 16,4 | 7 | 12,7 | 0 | 7,9 |
| | 65-69 ans | 11,6 | 16,4 | 7,6 | 25 | 0 | 8,3 |
| | 70-74 ans | 13,1 | 15,6 | 11,1 | 0 | 0 | 11,8 |
| | 50-74 ans | 11,2 | 16 | 7,4 | 15,5 | 3,6 | 8,2 |
| | 50-74 ans ** | 11,2 | 15,9 | 7 | - | - | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 9,2 | 16,6 | 3,6 | 15,4 | 3,4 | 3,8 |
| | 55-59 ans | 9,4 | 14,7 | 5,5 | 20 | 13,3 | 4,3 |
| | 60-64 ans | 7,9 | 14,5 | 2,8 | 12,7 | 0 | 3,2 |
| | 65-69 ans | 8,9 | 13,4 | 5,1 | 12,5 | 0 | 5,5 |
| | 70-74 ans | 10,5 | 13,7 | 7,9 | 0 | 0 | 8,4 |
| | 50-74 ans | 9,1 | 14,4 | 4,9 | 13,6 | 3,6 | 5,2 |
| | 50-74 ans ** | 9,6 | 14,8 | 4,8 | - | - | - |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 10,3 | 19 | 3,6 | 15,4 | 3,4 | 3,8 |
| | 55-59 ans | 10,5 | 17,1 | 5,5 | 20 | 13,3 | 4,3 |
| | 60-64 ans | 11 | 18,2 | 5,6 | 12,7 | 0 | 6,3 |
| | 65-69 ans | 13 | 20,8 | 6,3 | 25 | 0 | 6,9 |
| | 70-74 ans | 14 | 19,5 | 9,5 | 20,8 | 0 | 10,1 |
| | 50-74 ans | 11,9 | 19,1 | 6,2 | 17,4 | 3,6 | 6,7 |
| | 50-74 ans ** | 12 | 18,7 | 5,8 | - | - | - |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 0 | 3,4 | 6,2 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,1 | 0 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
| | 60-64 ans | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 0 | 0 | 2,1 | 1,6 |
| | 65-69 ans | 3,4 | 4,5 | 2,5 | 0 | 0 | 5,1 | 2,8 |
| | 70-74 ans | 6,1 | 11,7 | 1,6 | 0 | 0 | 12,9 | 1,7 |
| | 50-74 ans | 3,1 | 4,3 | 2,2 | 0 | 1,8 | 5,4 | 2,2 |
| | 50-74 ans ** | 2,7 | 3,2 | 2,2 | - | - | - | - |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | 55-59 ans | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 75 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| | 70-74 ans | 33,3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| | 50-74 ans | 60 | 55,6 | 66,7 | 0 | 0 | 55,6 | 66,7 |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)