

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 22 - Côtes d'Armor

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 2 855 | 1 285 | 1 570 | 673 | 747 | 612 | 823 |
| | 55-59 ans | 2 807 | 1 264 | 1 543 | 188 | 196 | 1 076 | 1 347 |
| | 60-64 ans | 3 588 | 1 561 | 2 027 | 196 | 266 | 1 365 | 1 761 |
| | 65-69 ans | 4 203 | 1 851 | 2 352 | 185 | 209 | 1 666 | 2 143 |
| | 70-74 ans | 2 500 | 1 146 | 1 354 | 102 | 108 | 1 044 | 1 246 |
| | 50-74 ans | 15 953 | 7 107 | 8 846 | 1 344 | 1 526 | 5 763 | 7 320 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 235 | 107 | 128 | 57 | 70 | 50 | 58 |
| | 55-59 ans | 172 | 83 | 89 | 13 | 9 | 70 | 80 |
| | 60-64 ans | 242 | 107 | 135 | 10 | 23 | 97 | 112 |
| | 65-69 ans | 255 | 103 | 152 | 8 | 10 | 95 | 142 |
| | 70-74 ans | 194 | 87 | 107 | 6 | 8 | 81 | 99 |
| | 50-74 ans | 1 098 | 487 | 611 | 94 | 120 | 393 | 491 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 98 | 48 | 50 | 23 | 28 | 25 | 22 |
| | 55-59 ans | 76 | 33 | 43 | 3 | 3 | 30 | 40 |
| | 60-64 ans | 114 | 59 | 55 | 5 | 6 | 54 | 49 |
| | 65-69 ans | 138 | 57 | 81 | 5 | 1 | 52 | 80 |
| | 70-74 ans | 97 | 40 | 57 | 2 | 3 | 38 | 54 |
| | 50-74 ans | 523 | 237 | 286 | 38 | 41 | 199 | 245 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 137 | 59 | 78 | 34 | 42 | 25 | 36 |
| | 55-59 ans | 96 | 50 | 46 | 10 | 6 | 40 | 40 |
| | 60-64 ans | 128 | 48 | 80 | 5 | 17 | 43 | 63 |
| | 65-69 ans | 117 | 46 | 71 | 3 | 9 | 43 | 62 |
| | 70-74 ans | 97 | 47 | 50 | 4 | 5 | 43 | 45 |
| | 50-74 ans | 575 | 250 | 325 | 56 | 79 | 194 | 246 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 2 718 | 1 226 | 1 492 | 639 | 705 | 587 | 787 |
| | 55-59 ans | 2 711 | 1 214 | 1 497 | 178 | 190 | 1 036 | 1 307 |
| | 60-64 ans | 3 460 | 1 513 | 1 947 | 191 | 249 | 1 322 | 1 698 |
| | 65-69 ans | 4 086 | 1 805 | 2 281 | 182 | 200 | 1 623 | 2 081 |
| | 70-74 ans | 2 403 | 1 099 | 1 304 | 98 | 103 | 1 001 | 1 201 |
| | 50-74 ans | 15 378 | 6 857 | 8 521 | 1 288 | 1 447 | 5 569 | 7 074 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 78 | 39 | 39 | 23 | 24 | 16 | 15 |
| | 55-59 ans | 86 | 52 | 34 | 9 | 7 | 43 | 27 |
| | 60-64 ans | 138 | 89 | 49 | 8 | 7 | 81 | 42 |
| | 65-69 ans | 195 | 101 | 94 | 11 | 10 | 90 | 84 |
| | 70-74 ans | 147 | 90 | 57 | 5 | 6 | 85 | 51 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 22 - Côtes d'Armor

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | | |
|---|------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 644 | 371 | 273 | 56 | 54 | 315 | 219 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 78 | 39 | 39 | 23 | 24 | 16 | 15 |
| | 55-59 ans | 86 | 52 | 34 | 9 | 7 | 43 | 27 |
| | 60-64 ans | 138 | 89 | 49 | 8 | 7 | 81 | 42 |
| | 65-69 ans | 194 | 101 | 93 | 11 | 10 | 90 | 83 |
| | 70-74 ans | 144 | 89 | 55 | 5 | 5 | 84 | 50 |
| | 50-74 ans | 640 | 370 | 270 | 56 | 53 | 314 | 217 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 66 | 34 | 32 | 21 | 20 | 13 | 12 |
| | 55-59 ans | 84 | 51 | 33 | 9 | 6 | 42 | 27 |
| | 60-64 ans | 130 | 82 | 48 | 8 | 6 | 74 | 42 |
| | 65-69 ans | 177 | 93 | 84 | 10 | 8 | 83 | 76 |
| | 70-74 ans | 136 | 83 | 53 | 5 | 4 | 78 | 49 |
| | 50-74 ans | 593 | 343 | 250 | 53 | 44 | 290 | 206 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 63 | 32 | 31 | 19 | 19 | 13 | 12 |
| | 55-59 ans | 82 | 49 | 33 | 8 | 6 | 41 | 27 |
| | 60-64 ans | 127 | 79 | 48 | 8 | 6 | 71 | 42 |
| | 65-69 ans | 174 | 91 | 83 | 10 | 8 | 81 | 75 |
| | 70-74 ans | 134 | 82 | 52 | 5 | 3 | 77 | 49 |
| | 50-74 ans | 580 | 333 | 247 | 50 | 42 | 283 | 205 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 64 | 33 | 31 | 20 | 19 | 13 | 12 |
| | 55-59 ans | 84 | 51 | 33 | 9 | 6 | 42 | 27 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 22 - Côtes d'Armor

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| 60-64 ans | 128 | 80 | 48 | 8 | 6 | 72 | 42 | |
| 65-69 ans | 176 | 92 | 84 | 10 | 8 | 82 | 76 | |
| 70-74 ans | 135 | 83 | 52 | 5 | 3 | 78 | 49 | |
| 50-74 ans | 587 | 339 | 248 | 52 | 42 | 287 | 206 | |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 50-74 ans | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 66 | 34 | 32 | 21 | 20 | 13 | 12 | |
| 55-59 ans | 84 | 51 | 33 | 9 | 6 | 42 | 27 | |
| 60-64 ans | 130 | 82 | 48 | 8 | 6 | 74 | 42 | |
| 65-69 ans | 177 | 93 | 84 | 10 | 8 | 83 | 76 | |
| 70-74 ans | 136 | 83 | 53 | 5 | 4 | 78 | 49 | |
| 50-74 ans | 593 | 343 | 250 | 53 | 44 | 290 | 206 | |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 66 | 34 | 32 | 21 | 20 | 13 | 12 | |
| 55-59 ans | 84 | 51 | 33 | 9 | 6 | 42 | 27 | |
| 60-64 ans | 130 | 82 | 48 | 8 | 6 | 74 | 42 | |
| 65-69 ans | 178 | 93 | 85 | 10 | 8 | 83 | 77 | |
| 70-74 ans | 136 | 83 | 53 | 5 | 4 | 78 | 49 | |
| 50-74 ans | 594 | 343 | 251 | 53 | 44 | 290 | 207 | |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 19 | 6 | 13 | 6 | 10 | 0 | 3 | |
| 55-59 ans | 29 | 14 | 15 | 1 | 3 | 13 | 12 | |
| 60-64 ans | 38 | 19 | 19 | 0 | 3 | 19 | 16 | |
| 65-69 ans | 54 | 22 | 32 | 3 | 3 | 19 | 29 | |
| 70-74 ans | 33 | 14 | 19 | 1 | 2 | 13 | 17 | |
| 50-74 ans | 173 | 75 | 98 | 11 | 21 | 64 | 77 | |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 22 - Côtes d'Armor

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| | 55-59 ans | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| | 60-64 ans | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| | 65-69 ans | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| | 70-74 ans | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| | 50-74 ans | 60 | 30 | 30 | 5 | 3 | 25 | 27 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| | 55-59 ans | 16 | 13 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 |
| | 60-64 ans | 25 | 15 | 10 | 1 | 1 | 14 | 9 |
| | 65-69 ans | 28 | 17 | 11 | 2 | 1 | 15 | 10 |
| | 70-74 ans | 33 | 25 | 8 | 2 | 0 | 23 | 8 |
| | 50-74 ans | 117 | 80 | 37 | 11 | 6 | 69 | 31 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 13 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| | 55-59 ans | 17 | 12 | 5 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| | 60-64 ans | 33 | 25 | 8 | 4 | 2 | 21 | 6 |
| | 65-69 ans | 64 | 38 | 26 | 5 | 3 | 33 | 23 |
| | 70-74 ans | 38 | 23 | 15 | 1 | 1 | 22 | 14 |
| | 50-74 ans | 165 | 104 | 61 | 18 | 10 | 86 | 51 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| | 65-69 ans | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| | 70-74 ans | 20 | 14 | 6 | 1 | 0 | 13 | 6 |
| | 50-74 ans | 52 | 34 | 18 | 5 | 3 | 29 | 15 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 22 - Côtes d'Armor

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 28 | 16 | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 |
| | 55-59 ans | 33 | 25 | 8 | 5 | 1 | 20 | 7 |
| | 60-64 ans | 58 | 40 | 18 | 5 | 3 | 35 | 15 |
| | 65-69 ans | 92 | 55 | 37 | 7 | 4 | 48 | 33 |
| | 70-74 ans | 71 | 48 | 23 | 3 | 1 | 45 | 22 |
| | 50-74 ans | 282 | 184 | 98 | 29 | 16 | 155 | 82 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 13 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| | 55-59 ans | 17 | 12 | 5 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| | 60-64 ans | 33 | 25 | 8 | 4 | 2 | 21 | 6 |
| | 65-69 ans | 64 | 38 | 26 | 5 | 3 | 33 | 23 |
| | 70-74 ans | 38 | 23 | 15 | 1 | 1 | 22 | 14 |
| | 50-74 ans | 165 | 104 | 61 | 18 | 10 | 86 | 51 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 22 - Côtes d'Armor

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| | 60-64 ans | 32 | 24 | 8 | 4 | 2 | 20 | 6 |
| | 65-69 ans | 55 | 34 | 21 | 5 | 3 | 29 | 18 |
| | 70-74 ans | 36 | 22 | 14 | 1 | 1 | 21 | 13 |
| | 50-74 ans | 150 | 98 | 52 | 18 | 10 | 80 | 42 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 20 | 15 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 |
| | 60-64 ans | 36 | 26 | 10 | 4 | 2 | 22 | 8 |
| | 65-69 ans | 63 | 40 | 23 | 6 | 3 | 34 | 20 |
| | 70-74 ans | 40 | 26 | 14 | 2 | 1 | 24 | 13 |
| | 50-74 ans | 171 | 113 | 58 | 20 | 10 | 93 | 48 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| | 65-69 ans | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| | 70-74 ans | 20 | 14 | 6 | 1 | 0 | 13 | 6 |
| | 50-74 ans | 52 | 34 | 18 | 5 | 3 | 29 | 15 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| | 65-69 ans | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| | 70-74 ans | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 | 12 | 6 |
| | 50-74 ans | 48 | 32 | 16 | 4 | 3 | 28 | 13 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| | 50-74 ans | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 22 - Côtes d'Armor

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Age | Hommes | | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| | 60-64 ans | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| | 65-69 ans | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| | 70-74 ans | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| | 50-74 ans | 35 | 23 | 12 | 3 | 3 | 20 | 9 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 50-74 ans | 23 | 15 | 8 | 3 | 3 | 12 | 5 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 22 - Côtes d'Armor

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| Age | Hommes | | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| | 65-69 ans | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| | 70-74 ans | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| | 50-74 ans | 44 | 30 | 14 | 4 | 3 | 26 | 11 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 |

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 8,5 | 9,4 | 8,2 | 7 |
| | 55-59 ans | 6,1 | 6,6 | 5,8 | 6,9 | 4,6 | 6,5 | 5,9 |
| | 60-64 ans | 6,7 | 6,9 | 6,7 | 5,1 | 8,6 | 7,1 | 6,4 |
| | 65-69 ans | 6,1 | 5,6 | 6,5 | 4,3 | 4,8 | 5,7 | 6,6 |
| | 70-74 ans | 7,8 | 7,6 | 7,9 | 5,9 | 7,4 | 7,8 | 7,9 |
| | 50-74 ans | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7 | 7,9 | 6,8 | 6,7 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 4,8 | 4,6 | 5 | 5,1 | 5,6 | 4,1 | 4,4 |
| | 55-59 ans | 3,4 | 4 | 3 | 5,3 | 3,1 | 3,7 | 3 |
| | 60-64 ans | 3,6 | 3,1 | 3,9 | 2,6 | 6,4 | 3,2 | 3,6 |
| | 65-69 ans | 2,8 | 2,5 | 3 | 1,6 | 4,3 | 2,6 | 2,9 |
| | 70-74 ans | 3,9 | 4,1 | 3,7 | 3,9 | 4,6 | 4,1 | 3,6 |
| | 50-74 ans | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 5,2 | 3,4 | 3,4 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 41,7 | 44,9 | 39,1 | 40,4 | 40 | 50 | 37,9 |
| | 55-59 ans | 44,2 | 39,8 | 48,3 | 23,1 | 33,3 | 42,9 | 50 |
| | 60-64 ans | 47,1 | 55,1 | 40,7 | 50 | 26,1 | 55,7 | 43,8 |
| | 65-69 ans | 54,1 | 55,3 | 53,3 | 62,5 | 10 | 54,7 | 56,3 |
| | 70-74 ans | 50 | 46 | 53,3 | 33,3 | 37,5 | 46,9 | 54,5 |
| | 50-74 ans | 47,6 | 48,7 | 46,8 | 40,4 | 34,2 | 50,6 | 49,9 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 2,9 | 3,2 | 2,6 | 3,6 | 3,4 | 2,7 | 1,9 |
| | 55-59 ans | 3,2 | 4,3 | 2,3 | 5,1 | 3,7 | 4,2 | 2,1 |
| | 60-64 ans | 4 | 5,9 | 2,5 | 4,2 | 2,8 | 6,1 | 2,5 |
| | 65-69 ans | 4,8 | 5,6 | 4,1 | 6 | 5 | 5,5 | 4 |
| | 70-74 ans | 6,1 | 8,2 | 4,4 | 5,1 | 5,8 | 8,5 | 4,2 |
| | 50-74 ans | 4,2 | 5,4 | 3,2 | 4,3 | 3,7 | 5,7 | 3,1 |
| 50-74 ans ** | 4 | 5,1 | 3 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 99,5 | 100 | 98,9 | 100 | 100 | 100 | 98,8 |
| | 70-74 ans | 98 | 98,9 | 96,5 | 100 | 83,3 | 98,8 | 98 |
| | 50-74 ans | 99,4 | 99,7 | 98,9 | 100 | 98,1 | 99,7 | 99,1 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 84,6 | 87,2 | 82,1 | 91,3 | 83,3 | 81,3 | 80 |
| | 55-59 ans | 97,7 | 98,1 | 97,1 | 100 | 85,7 | 97,7 | 100 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| 60-64 ans | 94,2 | 92,1 | 98 | 100 | 85,7 | 91,4 | 100 |
| 65-69 ans | 91,2 | 92,1 | 90,3 | 90,9 | 80 | 92,2 | 91,6 |
| 70-74 ans | 94,4 | 93,3 | 96,4 | 100 | 80 | 92,9 | 98 |
| 50-74 ans | 92,7 | 92,7 | 92,6 | 94,6 | 83 | 92,4 | 94,9 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | | | | | | | |
| 50-54 ans | 95,5 | 94,1 | 96,9 | 90,5 | 95 | 100 | 100 |
| 55-59 ans | 97,6 | 96,1 | 100 | 88,9 | 100 | 97,6 | 100 |
| 60-64 ans | 97,7 | 96,3 | 100 | 100 | 100 | 95,9 | 100 |
| 65-69 ans | 98,3 | 97,8 | 98,8 | 100 | 100 | 97,6 | 98,7 |
| 70-74 ans | 98,5 | 98,8 | 98,1 | 100 | 75 | 98,7 | 100 |
| 50-74 ans | 97,8 | 97,1 | 98,8 | 94,3 | 95,5 | 97,6 | 99,5 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | | | | | | | |
| 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | | | | | | | |
| 50-54 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| 55-59 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| 60-64 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| 65-69 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| 70-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| 50-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | | | | | | | |
| 50-54 ans | 82 | 84 | 81 | 82 | 85 | 87 | 73 |
| 55-59 ans | 94 | 97 | 90 | 127 | 118 | 90 | 84 |
| 60-64 ans | 79 | 78 | 81 | 68 | 77 | 80 | 81 |
| 65-69 ans | 84 | 86 | 82 | 74 | 101 | 87 | 80 |
| 70-74 ans | 90 | 95 | 81 | 123 | 79 | 93 | 82 |
| 50-74 ans | 85 | 88 | 83 | 90 | 91 | 87 | 81 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | | | | | | | |
| 50-54 ans | 77 (55-104) | 76,5 (57-105) | 77 (48-97,5) | 70 (55-104) | 77 (52-114) | 91 (69-105) | 77 (48-93) |
| 55-59 ans | 73,5 (56,5-95,5) | 73 (63-96) | 74 (50-95) | 69 (63-79) | 82 (42-98) | 80,5 (64-96) | 74 (50-95) |
| 60-64 ans | 68 (51-95) | 68 (46-95) | 68 (55-89,5) | 62 (42,5-93) | 70 (54-90) | 68 (47-96) | 68 (56-89) |
| 65-69 ans | 71 (50-97) | 73 (49-97) | 68 (52-95) | 74 (41-97) | 91 (44-154,5) | 73 (49-97) | 68 (53-92) |
| 70-74 ans | 74 (57-105) | 81 (58-116) | 69 (57-90) | 90 (81-91) | 73,5 (66,5-91,5) | 77,5 (57-116) | 69 (56-90) |
| 50-74 ans | 72 (53-97) | 73 (53-101) | 69,5 (53-95) | 72 (53-91) | 76,5 (53,5-114) | 73 (53-102) | 69 (53-93) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | | | | | | | |
| 50-54 ans | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,3 | 4,2 | 6,3 | 6,7 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60-64 ans | 1,4 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | |
| 65-69 ans | 3,1 | 4 | 2,1 | 9,1 | 0 | 3,3 | 2,4 | |
| 70-74 ans | 2 | 2,2 | 1,8 | 0 | 0 | 2,4 | 2 | |
| 50-74 ans | 2,3 | 2,7 | 1,8 | 3,6 | 1,9 | 2,5 | 1,8 | |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 50-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 28,8 | 17,6 | 40,6 | 28,6 | 50 | 0 | 25 | |
| 55-59 ans | 34,5 | 27,5 | 45,5 | 11,1 | 50 | 31 | 44,4 | |
| 60-64 ans | 29,2 | 23,2 | 39,6 | 0 | 50 | 25,7 | 38,1 | |
| 65-69 ans | 30,3 | 23,7 | 37,6 | 30 | 37,5 | 22,9 | 37,7 | |
| 70-74 ans | 24,3 | 16,9 | 35,8 | 20 | 50 | 16,7 | 34,7 | |
| 50-74 ans | 29,1 | 21,9 | 39 | 20,8 | 47,7 | 22,1 | 37,2 | |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 19,7 | 20,6 | 18,8 | 14,3 | 10 | 30,8 | 33,3 | |
| 55-59 ans | 11,9 | 9,8 | 15,2 | 11,1 | 0 | 9,5 | 18,5 | |
| 60-64 ans | 10 | 8,5 | 12,5 | 12,5 | 0 | 8,1 | 14,3 | |
| 65-69 ans | 7,9 | 5,4 | 10,6 | 0 | 0 | 6 | 11,7 | |
| 70-74 ans | 7,4 | 7,2 | 7,5 | 0 | 25 | 7,7 | 6,1 | |
| 50-74 ans | 10,1 | 8,7 | 12 | 9,4 | 6,8 | 8,6 | 13 | |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 1,5 | 2,9 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | |
| 55-59 ans | 2,4 | 3,9 | 0 | 11,1 | 0 | 2,4 | 0 | |
| 60-64 ans | 3,8 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | |
| 65-69 ans | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 0 | 0 | 2,4 | 1,3 | |
| 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50-74 ans | 1,9 | 2,9 | 0,4 | 3,8 | 0 | 2,8 | 0,5 | |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 22,7 | 29,4 | 15,6 | 19 | 15 | 46,2 | 16,7 | |
| 55-59 ans | 19 | 25,5 | 9,1 | 22,2 | 16,7 | 26,2 | 7,4 | |
| 60-64 ans | 19,2 | 18,3 | 20,8 | 12,5 | 16,7 | 18,9 | 21,4 | |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 15,7 | 18,3 | 12,9 | 20 | 12,5 | 18,1 | 13 |
| | 70-74 ans | 24,3 | 30,1 | 15,1 | 40 | 0 | 29,5 | 16,3 |
| | 50-74 ans | 19,7 | 23,3 | 14,7 | 20,8 | 13,6 | 23,8 | 15 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 19,7 | 17,6 | 21,9 | 23,8 | 20 | 7,7 | 25 |
| | 55-59 ans | 20,2 | 23,5 | 15,2 | 33,3 | 0 | 21,4 | 18,5 |
| | 60-64 ans | 25,4 | 30,5 | 16,7 | 50 | 33,3 | 28,4 | 14,3 |
| | 65-69 ans | 36 | 40,9 | 30,6 | 50 | 37,5 | 39,8 | 29,9 |
| | 70-74 ans | 27,9 | 27,7 | 28,3 | 20 | 25 | 28,2 | 28,6 |
| | 50-74 ans | 27,8 | 30,3 | 24,3 | 34 | 22,7 | 29,7 | 24,6 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 4,5 | 5,9 | 3,1 | 9,5 | 5 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 3,9 | 9,1 | 0 | 33,3 | 4,8 | 3,7 |
| | 60-64 ans | 10,8 | 12,2 | 8,3 | 25 | 0 | 10,8 | 9,5 |
| | 65-69 ans | 5,6 | 6,5 | 4,7 | 0 | 0 | 7,2 | 5,2 |
| | 70-74 ans | 14,7 | 16,9 | 11,3 | 20 | 0 | 16,7 | 12,2 |
| | 50-74 ans | 8,8 | 9,9 | 7,2 | 9,4 | 6,8 | 10 | 7,2 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1,5 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 5,9 | 6,1 | 11,1 | 0 | 4,8 | 7,4 |
| | 60-64 ans | 1,5 | 1,2 | 2,1 | 0 | 0 | 1,4 | 2,4 |
| | 65-69 ans | 1,1 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 |
| | 70-74 ans | 1,5 | 1,2 | 1,9 | 0 | 0 | 1,3 | 2 |
| | 50-74 ans | 2 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 0 | 2,4 | 1,9 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1,5 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1,7 | 1,1 | 2,4 | 0 | 12,5 | 1,2 | 1,3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0 | 2,3 | 0,7 | 0,5 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 10,3 | 13,1 | 8 | 14,1 | 9,9 | 11,9 | 6,4 |
| | 55-59 ans | 12,2 | 20,6 | 5,3 | 28,1 | 5,3 | 19,3 | 5,4 |
| | 60-64 ans | 16,8 | 26,4 | 9,2 | 26,2 | 12 | 26,5 | 8,8 |
| | 65-69 ans | 22,5 | 30,5 | 16,2 | 38,5 | 20 | 29,6 | 15,9 |
| | 70-74 ans | 29,5 | 43,7 | 17,6 | 30,6 | 9,7 | 45 | 18,3 |
| | 50-74 ans | 18,3 | 26,8 | 11,5 | 22,5 | 11,1 | 27,8 | 11,6 |
| | 50-74 ans ** | 17,1 | 24,5 | 10,3 | - | - | - | - |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 7,8 | 5,7 | 1,7 | 3,8 |
| | 55-59 ans | 6,3 | 9,9 | 3,3 | 16,9 | 0 | 8,7 | 3,8 |
| | 60-64 ans | 9,5 | 16,5 | 4,1 | 20,9 | 8 | 15,9 | 3,5 |
| | 65-69 ans | 15,7 | 21,1 | 11,4 | 27,5 | 15 | 20,3 | 11,1 |
| | 70-74 ans | 15,8 | 20,9 | 11,5 | 10,2 | 9,7 | 22 | 11,7 |
| | 50-74 ans | 10,7 | 15,2 | 7,2 | 14 | 6,9 | 15,4 | 7,2 |
| | 50-74 ans ** | 9,6 | 13,2 | 6,3 | - | - | - | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 4 | 4,9 | 3,4 | 7,8 | 5,7 | 1,7 | 1,3 |
| | 55-59 ans | 5,9 | 9,9 | 2,7 | 16,9 | 0 | 8,7 | 3,1 |
| | 60-64 ans | 9,2 | 15,9 | 4,1 | 20,9 | 8 | 15,1 | 3,5 |
| | 65-69 ans | 13,5 | 18,8 | 9,2 | 27,5 | 15 | 17,9 | 8,6 |
| | 70-74 ans | 15 | 20 | 10,7 | 10,2 | 9,7 | 21 | 10,8 |
| | 50-74 ans | 9,8 | 14,3 | 6,1 | 14 | 6,9 | 14,4 | 5,9 |
| | 50-74 ans ** | 8,8 | 12,6 | 5,4 | - | - | - | - |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 4,4 | 4,9 | 4 | 7,8 | 5,7 | 1,7 | 2,5 |
| | 55-59 ans | 7,4 | 12,4 | 3,3 | 16,9 | 0 | 11,6 | 3,8 |
| | 60-64 ans | 10,4 | 17,2 | 5,1 | 20,9 | 8 | 16,6 | 4,7 |
| | 65-69 ans | 15,4 | 22,2 | 10,1 | 33 | 15 | 20,9 | 9,6 |
| | 70-74 ans | 16,6 | 23,7 | 10,7 | 20,4 | 9,7 | 24 | 10,8 |
| | 50-74 ans | 11,1 | 16,5 | 6,8 | 15,5 | 6,9 | 16,7 | 6,8 |
| | 50-74 ans ** | 10,1 | 14,5 | 6 | - | - | - | - |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,1 | 1,6 | 0,7 | 3,1 | 1,4 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| 55-59 ans | 1,8 | 1,6 | 2 | 0 | 10,5 | 1,9 | 0,8 | |
| 60-64 ans | 4 | 6,6 | 2,1 | 10,5 | 0 | 6,1 | 2,4 | |
| 65-69 ans | 2,4 | 3,3 | 1,8 | 0 | 0 | 3,7 | 1,9 | |
| 70-74 ans | 8,3 | 12,7 | 4,6 | 10,2 | 0 | 13 | 5 | |
| 50-74 ans | 3,4 | 5 | 2,1 | 3,9 | 2,1 | 5,2 | 2,1 | |
| 50-74 ans ** | 3,2 | 4,5 | 2 | - | - | - | - | |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55-59 ans | 20 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 60-64 ans | 8,3 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | |
| 65-69 ans | 22,2 | 16,7 | 33,3 | 0 | 0 | 16,7 | 33,3 | |
| 70-74 ans | 42,1 | 53,8 | 16,7 | 100 | 0 | 50 | 16,7 | |
| 50-74 ans | 25 | 28,1 | 18,8 | 25 | 0 | 28,6 | 23,1 | |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)