

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 51 - Marne

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 11 340 | 5 264 | 6 076 | 2 816 | 3 121 | 2 448 | 2 955 |
| | 55-59 ans | 9 957 | 4 433 | 5 524 | 435 | 520 | 3 998 | 5 004 |
| | 60-64 ans | 11 713 | 5 111 | 6 602 | 430 | 483 | 4 681 | 6 119 |
| | 65-69 ans | 9 847 | 4 519 | 5 328 | 273 | 269 | 4 246 | 5 059 |
| | 70-74 ans | 6 777 | 2 985 | 3 792 | 152 | 169 | 2 833 | 3 623 |
| | 50-74 ans | 49 634 | 22 312 | 27 322 | 4 106 | 4 562 | 18 206 | 22 760 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 439 | 216 | 223 | 136 | 135 | 80 | 88 |
| | 55-59 ans | 391 | 177 | 214 | 23 | 42 | 154 | 172 |
| | 60-64 ans | 428 | 172 | 256 | 26 | 24 | 146 | 232 |
| | 65-69 ans | 367 | 178 | 189 | 23 | 16 | 155 | 173 |
| | 70-74 ans | 290 | 120 | 170 | 13 | 14 | 107 | 156 |
| | 50-74 ans | 1 915 | 863 | 1 052 | 221 | 231 | 642 | 821 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 309 | 150 | 159 | 85 | 83 | 65 | 76 |
| | 55-59 ans | 291 | 138 | 153 | 12 | 23 | 126 | 130 |
| | 60-64 ans | 323 | 131 | 192 | 18 | 10 | 113 | 182 |
| | 65-69 ans | 264 | 132 | 132 | 9 | 10 | 123 | 122 |
| | 70-74 ans | 207 | 92 | 115 | 7 | 5 | 85 | 110 |
| | 50-74 ans | 1 394 | 643 | 751 | 131 | 131 | 512 | 620 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 130 | 66 | 64 | 51 | 52 | 15 | 12 |
| | 55-59 ans | 100 | 39 | 61 | 11 | 19 | 28 | 42 |
| | 60-64 ans | 105 | 41 | 64 | 8 | 14 | 33 | 50 |
| | 65-69 ans | 103 | 46 | 57 | 14 | 6 | 32 | 51 |
| | 70-74 ans | 83 | 28 | 55 | 6 | 9 | 22 | 46 |
| | 50-74 ans | 521 | 220 | 301 | 90 | 100 | 130 | 201 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 11 210 | 5 198 | 6 012 | 2 765 | 3 069 | 2 433 | 2 943 |
| | 55-59 ans | 9 857 | 4 394 | 5 463 | 424 | 501 | 3 970 | 4 962 |
| | 60-64 ans | 11 608 | 5 070 | 6 538 | 422 | 469 | 4 648 | 6 069 |
| | 65-69 ans | 9 744 | 4 473 | 5 271 | 259 | 263 | 4 214 | 5 008 |
| | 70-74 ans | 6 694 | 2 957 | 3 737 | 146 | 160 | 2 811 | 3 577 |
| | 50-74 ans | 49 113 | 22 092 | 27 021 | 4 016 | 4 462 | 18 076 | 22 559 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 164 | 92 | 72 | 55 | 33 | 37 | 39 |
| | 55-59 ans | 162 | 93 | 69 | 13 | 7 | 80 | 62 |
| | 60-64 ans | 187 | 113 | 74 | 9 | 5 | 104 | 69 |
| | 65-69 ans | 167 | 88 | 79 | 8 | 9 | 80 | 70 |
| | 70-74 ans | 117 | 59 | 58 | 3 | 2 | 56 | 56 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 51 - Marne

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 797 | 445 | 352 | 88 | 56 | 357 | 296 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 163 | 91 | 72 | 54 | 33 | 37 | 39 |
| | 55-59 ans | 159 | 90 | 69 | 12 | 7 | 78 | 62 |
| | 60-64 ans | 184 | 110 | 74 | 8 | 5 | 102 | 69 |
| | 65-69 ans | 161 | 83 | 78 | 7 | 9 | 76 | 69 |
| | 70-74 ans | 114 | 58 | 56 | 3 | 2 | 55 | 54 |
| | 50-74 ans | 781 | 432 | 349 | 84 | 56 | 348 | 293 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 149 | 81 | 68 | 47 | 30 | 34 | 38 |
| | 55-59 ans | 148 | 84 | 64 | 11 | 5 | 73 | 59 |
| | 60-64 ans | 173 | 100 | 73 | 7 | 5 | 93 | 68 |
| | 65-69 ans | 148 | 75 | 73 | 6 | 9 | 69 | 64 |
| | 70-74 ans | 105 | 56 | 49 | 3 | 2 | 53 | 47 |
| | 50-74 ans | 723 | 396 | 327 | 74 | 51 | 322 | 276 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 145 | 80 | 65 | 46 | 30 | 34 | 35 |
| | 55-59 ans | 139 | 79 | 60 | 11 | 5 | 68 | 55 |
| | 60-64 ans | 165 | 95 | 70 | 7 | 5 | 88 | 65 |
| | 65-69 ans | 141 | 70 | 71 | 5 | 9 | 65 | 62 |
| | 70-74 ans | 98 | 51 | 47 | 3 | 1 | 48 | 46 |
| | 50-74 ans | 688 | 375 | 313 | 72 | 50 | 303 | 263 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 148 | 81 | 67 | 47 | 29 | 34 | 38 |
| | 55-59 ans | 147 | 83 | 64 | 11 | 5 | 72 | 59 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 51 - Marne

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 169 | 97 | 72 | 7 | 5 | 90 | 67 |
| | 65-69 ans | 148 | 75 | 73 | 6 | 9 | 69 | 64 |
| | 70-74 ans | 102 | 53 | 49 | 3 | 2 | 50 | 47 |
| | 50-74 ans | 714 | 389 | 325 | 74 | 50 | 315 | 275 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 50-74 ans | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 149 | 81 | 68 | 47 | 30 | 34 | 38 |
| | 55-59 ans | 148 | 84 | 64 | 11 | 5 | 73 | 59 |
| | 60-64 ans | 172 | 100 | 72 | 7 | 5 | 93 | 67 |
| | 65-69 ans | 147 | 74 | 73 | 6 | 9 | 68 | 64 |
| | 70-74 ans | 105 | 56 | 49 | 3 | 2 | 53 | 47 |
| | 50-74 ans | 721 | 395 | 326 | 74 | 51 | 321 | 275 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 149 | 81 | 68 | 47 | 30 | 34 | 38 |
| | 55-59 ans | 149 | 85 | 64 | 11 | 5 | 74 | 59 |
| | 60-64 ans | 174 | 101 | 73 | 7 | 5 | 94 | 68 |
| | 65-69 ans | 149 | 76 | 73 | 6 | 9 | 70 | 64 |
| | 70-74 ans | 105 | 56 | 49 | 3 | 2 | 53 | 47 |
| | 50-74 ans | 726 | 399 | 327 | 74 | 51 | 325 | 276 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 74 | 35 | 39 | 19 | 20 | 16 | 19 |
| | 55-59 ans | 74 | 39 | 35 | 5 | 4 | 34 | 31 |
| | 60-64 ans | 79 | 39 | 40 | 3 | 1 | 36 | 39 |
| | 65-69 ans | 65 | 27 | 38 | 3 | 3 | 24 | 35 |
| | 70-74 ans | 45 | 20 | 25 | 2 | 1 | 18 | 24 |
| | 50-74 ans | 337 | 160 | 177 | 32 | 29 | 128 | 148 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 51 - Marne

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| | 60-64 ans | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 34 | 20 | 14 | 6 | 1 | 14 | 13 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 19 | 13 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 |
| | 55-59 ans | 24 | 16 | 8 | 3 | 0 | 13 | 8 |
| | 60-64 ans | 25 | 18 | 7 | 1 | 1 | 17 | 6 |
| | 65-69 ans | 32 | 20 | 12 | 0 | 2 | 20 | 10 |
| | 70-74 ans | 20 | 12 | 8 | 1 | 0 | 11 | 8 |
| | 50-74 ans | 120 | 79 | 41 | 13 | 4 | 66 | 37 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 35 | 21 | 14 | 10 | 5 | 11 | 9 |
| | 55-59 ans | 26 | 14 | 12 | 1 | 1 | 13 | 11 |
| | 60-64 ans | 35 | 22 | 13 | 2 | 1 | 20 | 12 |
| | 65-69 ans | 28 | 14 | 14 | 3 | 2 | 11 | 12 |
| | 70-74 ans | 23 | 13 | 10 | 0 | 1 | 13 | 9 |
| | 50-74 ans | 147 | 84 | 63 | 16 | 10 | 68 | 53 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| | 60-64 ans | 15 | 8 | 7 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| | 65-69 ans | 17 | 11 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 |
| | 70-74 ans | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| | 50-74 ans | 61 | 38 | 23 | 7 | 6 | 31 | 17 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 51 - Marne

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| | 60-64 ans | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 54 | 34 | 20 | 18 | 6 | 16 | 14 |
| | 55-59 ans | 51 | 30 | 21 | 4 | 1 | 26 | 20 |
| | 60-64 ans | 60 | 40 | 20 | 3 | 2 | 37 | 18 |
| | 65-69 ans | 60 | 34 | 26 | 3 | 4 | 31 | 22 |
| | 70-74 ans | 43 | 25 | 18 | 1 | 1 | 24 | 17 |
| | 50-74 ans | 268 | 163 | 105 | 29 | 14 | 134 | 91 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 35 | 21 | 14 | 10 | 5 | 11 | 9 |
| | 55-59 ans | 26 | 14 | 12 | 1 | 1 | 13 | 11 |
| | 60-64 ans | 35 | 22 | 13 | 2 | 1 | 20 | 12 |
| | 65-69 ans | 28 | 14 | 14 | 3 | 2 | 11 | 12 |
| | 70-74 ans | 23 | 13 | 10 | 0 | 1 | 13 | 9 |
| | 50-74 ans | 147 | 84 | 63 | 16 | 10 | 68 | 53 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 51 - Marne

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 31 | 19 | 12 | 9 | 5 | 10 | 7 |
| | 55-59 ans | 22 | 12 | 10 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| | 60-64 ans | 34 | 22 | 12 | 2 | 0 | 20 | 12 |
| | 65-69 ans | 25 | 13 | 12 | 3 | 2 | 10 | 10 |
| | 70-74 ans | 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 11 | 9 |
| | 50-74 ans | 133 | 77 | 56 | 15 | 8 | 62 | 48 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 36 | 21 | 15 | 11 | 5 | 10 | 10 |
| | 55-59 ans | 25 | 14 | 11 | 1 | 1 | 13 | 10 |
| | 60-64 ans | 35 | 23 | 12 | 2 | 0 | 21 | 12 |
| | 65-69 ans | 30 | 17 | 13 | 3 | 2 | 14 | 11 |
| | 70-74 ans | 24 | 12 | 12 | 0 | 1 | 12 | 11 |
| | 50-74 ans | 150 | 87 | 63 | 17 | 9 | 70 | 54 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| | 60-64 ans | 15 | 8 | 7 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| | 65-69 ans | 17 | 11 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 |
| | 70-74 ans | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| | 50-74 ans | 61 | 38 | 23 | 7 | 6 | 31 | 17 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| | 60-64 ans | 13 | 7 | 6 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| | 65-69 ans | 16 | 11 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| | 70-74 ans | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| | 50-74 ans | 57 | 36 | 21 | 6 | 6 | 30 | 15 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 51 - Marne

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| | 65-69 ans | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| | 70-74 ans | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| | 50-74 ans | 40 | 25 | 15 | 3 | 4 | 22 | 11 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| | 70-74 ans | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| | 50-74 ans | 25 | 16 | 9 | 1 | 3 | 15 | 6 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 15 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 51 - Marne

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| | 65-69 ans | 16 | 11 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| | 70-74 ans | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| | 50-74 ans | 51 | 33 | 18 | 4 | 4 | 29 | 14 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 13 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| | 60-64 ans | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| | 65-69 ans | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| | 70-74 ans | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | 50-74 ans | 52 | 31 | 21 | 8 | 5 | 23 | 16 |

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 51 - Marne

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 3,9 | 4,1 | 3,7 | 4,8 | 4,3 | 3,3 | 3 |
| | 55-59 ans | 3,9 | 4 | 3,9 | 5,3 | 8,1 | 3,9 | 3,4 |
| | 60-64 ans | 3,7 | 3,4 | 3,9 | 6 | 5 | 3,1 | 3,8 |
| | 65-69 ans | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 8,4 | 5,9 | 3,7 | 3,4 |
| | 70-74 ans | 4,3 | 4 | 4,5 | 8,6 | 8,3 | 3,8 | 4,3 |
| | 50-74 ans | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 5,1 | 3,5 | 3,6 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 0,6 | 0,4 |
| | 55-59 ans | 1 | 0,9 | 1,1 | 2,5 | 3,7 | 0,7 | 0,8 |
| | 60-64 ans | 0,9 | 0,8 | 1 | 1,9 | 2,9 | 0,7 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 1,1 | 5,1 | 2,2 | 0,8 | 1 |
| | 70-74 ans | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 3,9 | 5,3 | 0,8 | 1,3 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 0,7 | 0,9 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 70,4 | 69,4 | 71,3 | 62,5 | 61,5 | 81,3 | 86,4 |
| | 55-59 ans | 74,4 | 78 | 71,5 | 52,2 | 54,8 | 81,8 | 75,6 |
| | 60-64 ans | 75,5 | 76,2 | 75 | 69,2 | 41,7 | 77,4 | 78,4 |
| | 65-69 ans | 71,9 | 74,2 | 69,8 | 39,1 | 62,5 | 79,4 | 70,5 |
| | 70-74 ans | 71,4 | 76,7 | 67,6 | 53,8 | 35,7 | 79,4 | 70,5 |
| | 50-74 ans | 72,8 | 74,5 | 71,4 | 59,3 | 56,7 | 79,8 | 75,5 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 2 | 1,1 | 1,5 | 1,3 |
| | 55-59 ans | 1,6 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 1,4 | 2 | 1,2 |
| | 60-64 ans | 1,6 | 2,2 | 1,1 | 2,1 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
| | 65-69 ans | 1,7 | 2 | 1,5 | 3,1 | 3,4 | 1,9 | 1,4 |
| | 70-74 ans | 1,7 | 2 | 1,6 | 2,1 | 1,3 | 2 | 1,6 |
| | 50-74 ans | 1,6 | 2 | 1,3 | 2,2 | 1,3 | 2 | 1,3 |
| 50-74 ans ** | 1,6 | 2 | 1,3 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 99,4 | 98,9 | 100 | 98,2 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 98,1 | 96,8 | 100 | 92,3 | 100 | 97,5 | 100 |
| | 60-64 ans | 98,4 | 97,3 | 100 | 88,9 | 100 | 98,1 | 100 |
| | 65-69 ans | 96,4 | 94,3 | 98,7 | 87,5 | 100 | 95 | 98,6 |
| | 70-74 ans | 97,4 | 98,3 | 96,6 | 100 | 100 | 98,2 | 96,4 |
| | 50-74 ans | 98 | 97,1 | 99,1 | 95,5 | 100 | 97,5 | 99 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 91,4 | 89 | 94,4 | 87 | 90,9 | 91,9 | 97,4 |
| | 55-59 ans | 93,1 | 93,3 | 92,8 | 91,7 | 71,4 | 93,6 | 95,2 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 51 - Marne

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 94 | 90,9 | 98,6 | 87,5 | 100 | 91,2 | 98,6 |
| | 65-69 ans | 91,9 | 90,4 | 93,6 | 85,7 | 100 | 90,8 | 92,8 |
| | 70-74 ans | 92,1 | 96,6 | 87,5 | 100 | 100 | 96,4 | 87 |
| | 50-74 ans | 92,6 | 91,7 | 93,7 | 88,1 | 91,1 | 92,5 | 94,2 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 97,3 | 98,8 | 95,6 | 97,9 | 100 | 100 | 92,1 |
| | 55-59 ans | 93,9 | 94 | 93,8 | 100 | 100 | 93,2 | 93,2 |
| | 60-64 ans | 95,4 | 95 | 95,9 | 100 | 100 | 94,6 | 95,6 |
| | 65-69 ans | 95,3 | 93,3 | 97,3 | 83,3 | 100 | 94,2 | 96,9 |
| | 70-74 ans | 93,3 | 91,1 | 95,9 | 100 | 50 | 90,6 | 97,9 |
| | 50-74 ans | 95,2 | 94,7 | 95,7 | 97,3 | 98 | 94,1 | 95,3 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 55-59 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 60-64 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 65-69 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 70-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 50-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 108 | 117 | 98 | 127 | 98 | 103 | 99 |
| | 55-59 ans | 114 | 123 | 101 | 206 | 91 | 110 | 102 |
| | 60-64 ans | 76 | 79 | 73 | 53 | 51 | 81 | 75 |
| | 65-69 ans | 93 | 86 | 99 | 85 | 64 | 87 | 104 |
| | 70-74 ans | 86 | 92 | 79 | 110 | 82 | 91 | 79 |
| | 50-74 ans | 95 | 99 | 90 | 128 | 86 | 93 | 91 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 63 (44-115) | 61 (44-117) | 63 (44,5-113,5) | 66 (46-136) | 63 (48-112) | 55,5 (42-117) | 67 (44-115) |
| | 55-59 ans | 67 (43,5-133) | 69 (46,5-144) | 64,5 (43-124) | 74 (63-359) | 87 (50-139) | 66 (43-131) | 64 (43-119) |
| | 60-64 ans | 57 (42-88) | 58 (42-84,5) | 57 (41-88) | 51 (31-67) | 57 (50-58) | 58 (42-92) | 57 (40-90,5) |
| | 65-69 ans | 66 (44-101,5) | 65 (43-93) | 67 (47-122) | 55,5 (43-111) | 51 (40-71) | 68 (45-88) | 70,5 (48-131) |
| | 70-74 ans | 65 (44-92) | 65 (46,5-101,5) | 66 (42-87) | 56 (48-225) | 81,5 (71-92) | 65 (46-100) | 64 (40-87) |
| | 50-74 ans | 64 (43-100) | 64 (43-100) | 63 (43-103) | 65,5 (48-112) | 60 (42-106) | 64 (43-98) | 64 (43-103) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 7,9 | 9,8 | 5,6 | 12,7 | 9,1 | 5,4 | 2,6 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 51 - Marne

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 6,8 | 6,5 | 7,2 | 7,7 | 28,6 | 6,3 | 4,8 |
| | 60-64 ans | 4,8 | 7,1 | 1,4 | 0 | 0 | 7,7 | 1,4 |
| | 65-69 ans | 6,6 | 6,8 | 6,3 | 0 | 0 | 7,5 | 7,1 |
| | 70-74 ans | 6,8 | 3,4 | 10,3 | 0 | 0 | 3,6 | 10,7 |
| | 50-74 ans | 6,5 | 7 | 6 | 9,1 | 8,9 | 6,4 | 5,4 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 99,4 | 100 | 98,6 | 100 | 100 | 100 | 98,5 |
| | 65-69 ans | 99,3 | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 98,6 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 100 | 100 | 99,7 | 99,6 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 49,7 | 43,2 | 57,4 | 40,4 | 66,7 | 47,1 | 50 |
| | 55-59 ans | 49,7 | 45,9 | 54,7 | 45,5 | 80 | 45,9 | 52,5 |
| | 60-64 ans | 45,4 | 38,6 | 54,8 | 42,9 | 20 | 38,3 | 57,4 |
| | 65-69 ans | 43,6 | 35,5 | 52,1 | 50 | 33,3 | 34,3 | 54,7 |
| | 70-74 ans | 42,9 | 35,7 | 51 | 66,7 | 50 | 34 | 51,1 |
| | 50-74 ans | 46,4 | 40,1 | 54,1 | 43,2 | 56,9 | 39,4 | 53,6 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 5,4 | 7,4 | 2,9 | 8,5 | 3,3 | 5,9 | 2,6 |
| | 55-59 ans | 6 | 4,7 | 7,8 | 9,1 | 0 | 4,1 | 8,5 |
| | 60-64 ans | 6,9 | 7,9 | 5,5 | 14,3 | 0 | 7,4 | 5,9 |
| | 65-69 ans | 2 | 1,3 | 2,7 | 0 | 0 | 1,4 | 3,1 |
| | 70-74 ans | 1,9 | 1,8 | 2 | 0 | 0 | 1,9 | 2,1 |
| | 50-74 ans | 4,7 | 5 | 4,3 | 8,1 | 2 | 4,3 | 4,7 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,3 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 12,8 | 16 | 8,8 | 17 | 3,3 | 14,7 | 13,2 |
| | 55-59 ans | 16,1 | 18,8 | 12,5 | 27,3 | 0 | 17,6 | 13,6 |
| | 60-64 ans | 14,4 | 17,8 | 9,6 | 14,3 | 20 | 18,1 | 8,8 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 51 - Marne

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 21,5 | 26,3 | 16,4 | 0 | 22,2 | 28,6 | 15,6 |
| | 70-74 ans | 19 | 21,4 | 16,3 | 33,3 | 0 | 20,8 | 17 |
| | 50-74 ans | 16,5 | 19,8 | 12,5 | 17,6 | 7,8 | 20,3 | 13,4 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 23,5 | 25,9 | 20,6 | 21,3 | 16,7 | 32,4 | 23,7 |
| | 55-59 ans | 17,4 | 16,5 | 18,8 | 9,1 | 20 | 17,6 | 18,6 |
| | 60-64 ans | 20,1 | 21,8 | 17,8 | 28,6 | 20 | 21,3 | 17,6 |
| | 65-69 ans | 18,8 | 18,4 | 19,2 | 50 | 22,2 | 15,7 | 18,8 |
| | 70-74 ans | 21,9 | 23,2 | 20,4 | 0 | 50 | 24,5 | 19,1 |
| | 50-74 ans | 20,2 | 21,1 | 19,3 | 21,6 | 19,6 | 20,9 | 19,2 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 6,7 | 7,4 | 5,9 | 12,8 | 10 | 0 | 2,6 |
| | 55-59 ans | 5,4 | 5,9 | 4,7 | 9,1 | 0 | 5,4 | 5,1 |
| | 60-64 ans | 8,6 | 7,9 | 9,6 | 0 | 40 | 8,5 | 7,4 |
| | 65-69 ans | 11,4 | 14,5 | 8,2 | 0 | 11,1 | 15,7 | 7,8 |
| | 70-74 ans | 10,5 | 14,3 | 6,1 | 0 | 0 | 15,1 | 6,4 |
| | 50-74 ans | 8,4 | 9,5 | 7 | 9,5 | 11,8 | 9,5 | 6,2 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| | 65-69 ans | 0,7 | 0 | 1,4 | 0 | 11,1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,3 | 0 | 0,6 | 0 | 2 | 0 | 0,4 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1,3 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| | 55-59 ans | 3,4 | 4,7 | 1,6 | 0 | 0 | 5,4 | 1,7 |
| | 60-64 ans | 2,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 0 |
| | 65-69 ans | 1,3 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1,8 | 2,5 | 0,9 | 0 | 0 | 3,1 | 1,1 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| | 65-69 ans | 0,7 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 51 - Marne

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
| | 50-74 ans | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0 | 0 | 0,3 | 0,7 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 4,8 | 6,5 | 3,3 | 6,5 | 2 | 6,6 | 4,8 |
| | 55-59 ans | 5,2 | 6,8 | 3,8 | 9,4 | 2 | 6,5 | 4 |
| | 60-64 ans | 5,2 | 7,9 | 3,1 | 7,1 | 4,3 | 8 | 3 |
| | 65-69 ans | 6,2 | 7,6 | 4,9 | 11,6 | 15,2 | 7,4 | 4,4 |
| | 70-74 ans | 6,4 | 8,5 | 4,8 | 6,8 | 6,3 | 8,5 | 4,8 |
| | 50-74 ans | 5,5 | 7,4 | 3,9 | 7,2 | 3,1 | 7,4 | 4 |
| | 50-74 ans ** | 5,5 | 7,3 | 3,9 | - | - | - | - |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,1 | 4 | 2,3 | 3,6 | 1,6 | 4,5 | 3,1 |
| | 55-59 ans | 2,6 | 3,2 | 2,2 | 2,4 | 2 | 3,3 | 2,2 |
| | 60-64 ans | 3 | 4,3 | 2 | 4,7 | 2,1 | 4,3 | 2 |
| | 65-69 ans | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 11,6 | 7,6 | 2,6 | 2,4 |
| | 70-74 ans | 3,4 | 4,4 | 2,7 | 0 | 6,3 | 4,6 | 2,5 |
| | 50-74 ans | 3 | 3,8 | 2,3 | 4 | 2,2 | 3,8 | 2,3 |
| | 50-74 ans ** | 3 | 3,8 | 2,3 | - | - | - | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,8 | 3,7 | 2 | 3,3 | 1,6 | 4,1 | 2,4 |
| | 55-59 ans | 2,2 | 2,7 | 1,8 | 2,4 | 0 | 2,8 | 2 |
| | 60-64 ans | 2,9 | 4,3 | 1,8 | 4,7 | 0 | 4,3 | 2 |
| | 65-69 ans | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 11,6 | 7,6 | 2,4 | 2 |
| | 70-74 ans | 3,1 | 3,7 | 2,7 | 0 | 6,3 | 3,9 | 2,5 |
| | 50-74 ans | 2,7 | 3,5 | 2,1 | 3,7 | 1,8 | 3,4 | 2,1 |
| | 50-74 ans ** | 2,7 | 3,5 | 2,1 | - | - | - | - |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,2 | 4 | 2,5 | 4 | 1,6 | 4,1 | 3,4 |
| | 55-59 ans | 2,5 | 3,2 | 2 | 2,4 | 2 | 3,3 | 2 |
| | 60-64 ans | 3 | 4,5 | 1,8 | 4,7 | 0 | 4,5 | 2 |
| | 65-69 ans | 3,1 | 3,8 | 2,5 | 11,6 | 7,6 | 3,3 | 2,2 |
| | 70-74 ans | 3,6 | 4,1 | 3,2 | 0 | 6,3 | 4,3 | 3,1 |
| | 50-74 ans | 3,1 | 3,9 | 2,3 | 4,2 | 2 | 3,9 | 2,4 |
| | 50-74 ans ** | 3,1 | 3,9 | 2,3 | - | - | - | - |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 2,2 | 1 | 0 | 0,3 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 51 - Marne

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 2,4 | 0 | 1 | 0,6 |
| | 60-64 ans | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 0 | 4,3 | 1,7 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 1,7 | 2,5 | 1,1 | 0 | 3,8 | 2,6 | 1 |
| | 70-74 ans | 1,6 | 2,7 | 0,8 | 0 | 0 | 2,8 | 0,8 |
| | 50-74 ans | 1,2 | 1,7 | 0,9 | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 0,8 |
| | 50-74 ans ** | 1,2 | 1,6 | 0,8 | - | - | - | - |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 44,4 | 40 | 50 | 40 | 33,3 | 0 | 100 |
| | 55-59 ans | 50 | 60 | 33,3 | 100 | 0 | 50 | 33,3 |
| | 60-64 ans | 23,1 | 28,6 | 16,7 | 0 | 0 | 28,6 | 25 |
| | 65-69 ans | 12,5 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 18,2 | 0 |
| | 70-74 ans | 9,1 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 |
| | 50-74 ans | 24,6 | 27,8 | 19 | 50 | 16,7 | 23,3 | 20 |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)