

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 264	3 417	3 847	2 056	2 139	1 361	1 708
	55-59 ans	6 945	3 130	3 815	495	516	2 635	3 299
	60-64 ans	7 768	3 479	4 289	430	487	3 049	3 802
	65-69 ans	6 631	3 077	3 554	325	318	2 752	3 236
	70-74 ans	4 917	2 312	2 605	193	243	2 119	2 362
	<b>50-74 ans</b>	<b>33 525</b>	<b>15 415</b>	<b>18 110</b>	<b>3 499</b>	<b>3 703</b>	<b>11 916</b>	<b>14 407</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	402	189	213	121	138	68	75
	55-59 ans	379	180	199	49	47	131	152
	60-64 ans	376	173	203	31	44	142	159
	65-69 ans	313	151	162	28	37	123	125
	70-74 ans	276	122	154	26	22	96	132
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 746</b>	<b>815</b>	<b>931</b>	<b>255</b>	<b>288</b>	<b>560</b>	<b>643</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	305	140	165	81	101	59	64
	55-59 ans	296	137	159	31	31	106	128
	60-64 ans	311	148	163	24	25	124	138
	65-69 ans	263	128	135	21	27	107	108
	70-74 ans	223	100	123	17	13	83	110
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 398</b>	<b>653</b>	<b>745</b>	<b>174</b>	<b>197</b>	<b>479</b>	<b>548</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	97	49	48	40	37	9	11
	55-59 ans	83	43	40	18	16	25	24
	60-64 ans	65	25	40	7	19	18	21
	65-69 ans	50	23	27	7	10	16	17
	70-74 ans	53	22	31	9	9	13	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>348</b>	<b>162</b>	<b>186</b>	<b>81</b>	<b>91</b>	<b>81</b>	<b>95</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 167	3 368	3 799	2 016	2 102	1 352	1 697
	55-59 ans	6 862	3 087	3 775	477	500	2 610	3 275
	60-64 ans	7 703	3 454	4 249	423	468	3 031	3 781
	65-69 ans	6 581	3 054	3 527	318	308	2 736	3 219
	70-74 ans	4 863	2 290	2 573	184	234	2 106	2 339
	<b>50-74 ans</b>	<b>33 176</b>	<b>15 253</b>	<b>17 923</b>	<b>3 418</b>	<b>3 612</b>	<b>11 835</b>	<b>14 311</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	177	84	93	55	50	29	43
	55-59 ans	196	102	94	20	13	82	81
	60-64 ans	223	114	109	12	13	102	96
	65-69 ans	233	115	118	22	17	93	101
	70-74 ans	181	99	82	12	6	87	76

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 79 - Deux-Sèvres

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 010</b>	<b>514</b>	<b>496</b>	<b>121</b>	<b>99</b>	<b>393</b>	<b>397</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	175	83	92	54	49	29	43
	55-59 ans	194	100	94	20	13	80	81
	60-64 ans	222	114	108	12	13	102	95
	65-69 ans	227	112	115	21	15	91	100
	70-74 ans	176	97	79	12	6	85	73
	<b>50-74 ans</b>	<b>994</b>	<b>506</b>	<b>488</b>	<b>119</b>	<b>96</b>	<b>387</b>	<b>392</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	159	76	83	49	44	27	39
	55-59 ans	185	95	90	17	13	78	77
	60-64 ans	206	107	99	11	10	96	89
	65-69 ans	209	99	110	18	13	81	97
	70-74 ans	159	90	69	10	5	80	64
	<b>50-74 ans</b>	<b>918</b>	<b>467</b>	<b>451</b>	<b>105</b>	<b>85</b>	<b>362</b>	<b>366</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	151	73	78	47	40	26	38
	55-59 ans	167	84	83	14	13	70	70
	60-64 ans	190	96	94	9	10	87	84
	65-69 ans	181	83	98	14	13	69	85
	70-74 ans	141	78	63	9	4	69	59
	<b>50-74 ans</b>	<b>830</b>	<b>414</b>	<b>416</b>	<b>93</b>	<b>80</b>	<b>321</b>	<b>336</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	159	76	83	49	44	27	39

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 79 - Deux-Sèvres

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	184	95	89	17	13	78	76
	60-64 ans	204	105	99	11	10	94	89
	65-69 ans	206	98	108	17	13	81	95
	70-74 ans	159	90	69	10	5	80	64
	<b>50-74 ans</b>	<b>912</b>	<b>464</b>	<b>448</b>	<b>104</b>	<b>85</b>	<b>360</b>	<b>363</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	158	76	82	49	43	27	39
	55-59 ans	184	95	89	17	13	78	76
	60-64 ans	204	105	99	11	10	94	89
	65-69 ans	209	99	110	18	13	81	97
	70-74 ans	159	90	69	10	5	80	64
	<b>50-74 ans</b>	<b>914</b>	<b>465</b>	<b>449</b>	<b>105</b>	<b>84</b>	<b>360</b>	<b>365</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	159	76	83	49	44	27	39
	55-59 ans	186	95	91	17	13	78	78
	60-64 ans	206	107	99	11	10	96	89
	65-69 ans	209	99	110	18	13	81	97
	70-74 ans	160	91	69	10	5	81	64
	<b>50-74 ans</b>	<b>920</b>	<b>468</b>	<b>452</b>	<b>105</b>	<b>85</b>	<b>363</b>	<b>367</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	86	34	52	21	28	13	24
	55-59 ans	82	36	46	4	9	32	37
	60-64 ans	92	33	59	3	4	30	55
	65-69 ans	86	29	57	3	6	26	51
	70-74 ans	60	24	36	3	2	21	34

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>406</b>	<b>156</b>	<b>250</b>	<b>34</b>	<b>49</b>	<b>122</b>	<b>201</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	8	3	5	3	2	0	3
	55-59 ans	9	5	4	2	0	3	4
	60-64 ans	15	8	7	2	2	6	5
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3
	70-74 ans	10	5	5	0	1	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>52</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	24	17	7	9	4	8	3
	55-59 ans	33	15	18	1	2	14	16
	60-64 ans	31	19	12	0	1	19	11
	65-69 ans	37	19	18	2	2	17	16
	70-74 ans	25	18	7	2	0	16	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>150</b>	<b>88</b>	<b>62</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>74</b>	<b>53</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	27	16	11	13	5	3	6
	55-59 ans	35	26	9	8	1	18	8
	60-64 ans	39	27	12	2	1	25	11
	65-69 ans	43	23	20	4	2	19	18
	70-74 ans	34	22	12	1	1	21	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>178</b>	<b>114</b>	<b>64</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>86</b>	<b>54</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	14	10	4	1	1	9	3
	65-69 ans	15	12	3	5	1	7	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	21	15	6	3	1	12	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>13</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	7	5	2	1	1	4	1
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	51	33	18	22	9	11	9
	55-59 ans	68	41	27	9	3	32	24
	60-64 ans	70	46	24	2	2	44	22
	65-69 ans	80	42	38	6	4	36	34
	70-74 ans	59	40	19	3	1	37	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>328</b>	<b>202</b>	<b>126</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>160</b>	<b>107</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	27	16	11	13	5	3	6
	55-59 ans	35	26	9	8	1	18	8
	60-64 ans	39	27	12	2	1	25	11
	65-69 ans	43	23	20	4	2	19	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	34	22	12	1	1	21	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>178</b>	<b>114</b>	<b>64</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>86</b>	<b>54</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	20	13	7	11	3	2	4
	55-59 ans	30	23	7	7	0	16	7
	60-64 ans	31	24	7	2	1	22	6
	65-69 ans	32	15	17	3	2	12	15
	70-74 ans	25	16	9	1	1	15	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>138</b>	<b>91</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>67</b>	<b>40</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	22	14	8	12	4	2	4
	55-59 ans	32	25	7	7	0	18	7
	60-64 ans	33	25	8	2	1	23	7
	65-69 ans	40	21	19	3	2	18	17
	70-74 ans	35	23	12	2	1	21	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>162</b>	<b>108</b>	<b>54</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>82</b>	<b>46</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	14	10	4	1	1	9	3
	65-69 ans	15	12	3	5	1	7	2
	70-74 ans	21	15	6	3	1	12	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>13</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	13	10	3	1	1	9	2
	65-69 ans	15	12	3	5	1	7	2
	70-74 ans	20	14	6	2	1	12	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>12</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	10	7	3	1	1	6	2
	65-69 ans	11	8	3	4	1	4	2
	70-74 ans	14	9	5	2	1	7	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>10</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	7	5	2	0	0	5	2
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	14	10	4	0	0	10	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>8</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	13	7	6	5	5	2	1
	55-59 ans	8	5	3	3	0	2	3
	60-64 ans	16	7	9	1	3	6	6
	65-69 ans	16	12	4	3	1	9	3
	70-74 ans	14	6	8	2	1	4	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>67</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>20</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,5	5,5	5,5	5,9	6,5	5	4,4
	55-59 ans	5,5	5,8	5,2	9,9	9,1	5	4,6
	60-64 ans	4,8	5	4,7	7,2	9	4,7	4,2
	65-69 ans	4,7	4,9	4,6	8,6	11,6	4,5	3,9
	70-74 ans	5,6	5,3	5,9	13,5	9,1	4,5	5,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>	<b>5,1</b>	<b>7,3</b>	<b>7,8</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,4	1,2	1,9	1,7	0,7	0,6
	55-59 ans	1,2	1,4	1	3,6	3,1	0,9	0,7
	60-64 ans	0,8	0,7	0,9	1,6	3,9	0,6	0,6
	65-69 ans	0,8	0,7	0,8	2,2	3,1	0,6	0,5
	70-74 ans	1,1	1	1,2	4,7	3,7	0,6	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,9	74,1	77,5	66,9	73,2	86,8	85,3
	55-59 ans	78,1	76,1	79,9	63,3	66	80,9	84,2
	60-64 ans	82,7	85,5	80,3	77,4	56,8	87,3	86,8
	65-69 ans	84	84,8	83,3	75	73	87	86,4
	70-74 ans	80,8	82	79,9	65,4	59,1	86,5	83,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>80,1</b>	<b>80,1</b>	<b>80</b>	<b>68,2</b>	<b>68,4</b>	<b>85,5</b>	<b>85,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	2,5	2,4	2,7	2,4	2,1	2,5
	55-59 ans	2,9	3,3	2,5	4,2	2,6	3,1	2,5
	60-64 ans	2,9	3,3	2,6	2,8	2,8	3,4	2,5
	65-69 ans	3,5	3,8	3,3	6,9	5,5	3,4	3,1
	70-74 ans	3,7	4,3	3,2	6,5	2,6	4,1	3,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>	<b>3,5</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3</b>	<b>3,3</b>	<b>2,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	98,8	98,9	98,2	98	100	100
	55-59 ans	99	98	100	100	100	97,6	100
	60-64 ans	99,6	100	99,1	100	100	100	99
	65-69 ans	97,4	97,4	97,5	95,5	88,2	97,8	99
	70-74 ans	97,2	98	96,3	100	100	97,7	96,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>	<b>98,3</b>	<b>97</b>	<b>98,5</b>	<b>98,7</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,9	91,6	90,2	90,7	89,8	93,1	90,7
	55-59 ans	95,4	95	95,7	85	100	97,5	95,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,8	93,9	91,7	91,7	76,9	94,1	93,7
	65-69 ans	92,1	88,4	95,7	85,7	86,7	89	97
	70-74 ans	90,3	92,8	87,3	83,3	83,3	94,1	87,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>92,4</b>	<b>92,3</b>	<b>92,4</b>	<b>88,2</b>	<b>88,5</b>	<b>93,5</b>	<b>93,4</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95	96,1	94	95,9	90,9	96,3	97,4
	55-59 ans	90,3	88,4	92,2	82,4	100	89,7	90,9
	60-64 ans	92,2	89,7	94,9	81,8	100	90,6	94,4
	65-69 ans	86,6	83,8	89,1	77,8	100	85,2	87,6
	70-74 ans	88,7	86,7	91,3	90	80	86,3	92,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,4</b>	<b>88,7</b>	<b>92,2</b>	<b>88,6</b>	<b>94,1</b>	<b>88,7</b>	<b>91,8</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	134	126	141	116	162	144	117
	55-59 ans	114	117	112	133	84	113	116
	60-64 ans	107	113	100	111	105	114	99
	65-69 ans	113	122	106	100	107	127	105
	70-74 ans	111	115	106	85	89	118	107
	<b>50-74 ans</b>	<b>115</b>	<b>118</b>	<b>112</b>	<b>113</b>	<b>132</b>	<b>120</b>	<b>108</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95,5 (67-135)	95 (65-128)	96 (71-140)	85,5 (57-117,5)	99 (66-144,5)	101 (72-176)	95 (77-135)
	55-59 ans	92 (67-125)	90 (69-124)	95 (65-128)	101 (86-136)	87 (59-103)	89 (67-122)	100 (67-130)
	60-64 ans	90 (68-119)	95 (71-119)	87 (65-115)	87 (79-106)	68,5 (55-120)	96 (70-120)	88 (66-113,5)
	65-69 ans	92 (64-125)	99 (63-127)	85,5 (66-124)	93 (62-115)	87 (79-134)	100 (64-131)	85 (64-124)
	70-74 ans	87 (66-118,5)	91,5 (67-126)	84,5 (65,5-112)	88 (59-105)	64,5 (62-116,5)	92 (68-126)	86 (69,5-112)
	<b>50-74 ans</b>	<b>91 (66-125)</b>	<b>94 (68-125)</b>	<b>89 (66-124)</b>	<b>89,5 (62-119)</b>	<b>88,5 (62,5-127,5)</b>	<b>95 (69-126)</b>	<b>89 (66-122)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,3	8,3	6,5	9,1	10	6,9	2,3
	55-59 ans	4,1	4,9	3,2	15	0	2,4	3,7
	60-64 ans	7,2	6,1	8,3	8,3	23,1	5,9	6,3
	65-69 ans	6,9	10,4	3,4	13,6	5,9	9,7	3
	70-74 ans	7,7	6,1	9,8	16,7	16,7	4,6	9,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>7,2</b>	<b>6</b>	<b>11,6</b>	<b>10,1</b>	<b>5,9</b>	<b>5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	100	98,8	100	97,7	100	100
	55-59 ans	99,5	100	98,9	100	100	100	98,7
	60-64 ans	99	98,1	100	100	100	97,9	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>100</b>	<b>98,8</b>	<b>99,4</b>	<b>99,7</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,1	44,7	62,7	42,9	63,6	48,1	61,5
	55-59 ans	44,1	37,9	50,5	23,5	69,2	41	47,4
	60-64 ans	44,7	30,8	59,6	27,3	40	31,3	61,8
	65-69 ans	41,1	29,3	51,8	16,7	46,2	32,1	52,6
	70-74 ans	37,5	26,4	52,2	30	40	25,9	53,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>44,1</b>	<b>33,3</b>	<b>55,3</b>	<b>32,4</b>	<b>57,6</b>	<b>33,6</b>	<b>54,8</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5	3,9	6	6,1	4,5	0	7,7
	55-59 ans	4,8	5,3	4,4	11,8	0	3,8	5,1
	60-64 ans	7,3	7,5	7,1	18,2	20	6,3	5,6
	65-69 ans	4,8	6,1	3,6	5,6	7,7	6,2	3,1
	70-74 ans	6,3	5,5	7,2	0	20	6,2	6,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>5,8</b>	<b>5,5</b>	<b>7,6</b>	<b>7,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	0	2,4	0	2,3	0	2,6
	55-59 ans	0,5	1,1	0	0	0	1,3	0
	60-64 ans	0,5	0,9	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0,5	1	0	5,6	0	0	0
	70-74 ans	1,3	1,1	1,4	0	0	1,2	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,1	22,4	8,4	18,4	9,1	29,6	7,7
	55-59 ans	17,7	15,8	19,8	5,9	15,4	17,9	20,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	15	17,8	12,1	0	10	19,8	12,4
	65-69 ans	17,7	19,2	16,4	11,1	15,4	21	16,5
	70-74 ans	15,6	19,8	10,1	20	0	19,8	10,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,3</b>	<b>18,8</b>	<b>13,7</b>	<b>13,3</b>	<b>10,6</b>	<b>20,4</b>	<b>14,4</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17	21,1	13,3	26,5	11,4	11,1	15,4
	55-59 ans	18,8	27,4	9,9	47,1	7,7	23,1	10,3
	60-64 ans	18,9	25,2	12,1	18,2	10	26	12,4
	65-69 ans	20,6	23,2	18,2	22,2	15,4	23,5	18,6
	70-74 ans	21,3	24,2	17,4	10	20	25,9	17,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,3</b>	<b>24,4</b>	<b>14,2</b>	<b>26,7</b>	<b>11,8</b>	<b>23,7</b>	<b>14,7</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,5	3,9	1,2	4,1	2,3	3,7	0
	55-59 ans	3,2	3,2	3,3	5,9	0	2,6	3,8
	60-64 ans	6,8	9,3	4	9,1	10	9,4	3,4
	65-69 ans	7,2	12,1	2,7	27,8	7,7	8,6	2,1
	70-74 ans	13,1	16,5	8,7	30	20	14,8	7,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>9,2</b>	<b>3,8</b>	<b>11,4</b>	<b>4,7</b>	<b>8,5</b>	<b>3,5</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0,9	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1,4	1	1,8	0	0	1,2	2,1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,6	1,3	0	0	0	3,7	0
	55-59 ans	3,8	5,3	2,2	5,9	7,7	5,1	1,3
	60-64 ans	2,4	1,9	3	9,1	0	1	3,4
	65-69 ans	1,4	3	0	5,6	0	2,5	0
	70-74 ans	2,5	2,2	2,9	0	0	2,5	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,5</b>	<b>2,9</b>	<b>1,2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0	1,2	0	2,3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1,9	0	0	0	2,1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	9,8	4,7	10,9	4,3	8,1	5,3
	55-59 ans	9,9	13,3	7,2	18,9	6	12,3	7,3
	60-64 ans	9,1	13,3	5,6	4,7	4,3	14,5	5,8
	65-69 ans	12,2	13,8	10,8	18,9	13	13,2	10,6
	70-74 ans	12,1	17,5	7,4	16,3	4,3	17,6	7,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,9</b>	<b>13,2</b>	<b>7</b>	<b>12,3</b>	<b>5,3</b>	<b>13,5</b>	<b>7,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,8</b>	<b>13</b>	<b>6,8</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,8	4,8	2,9	6,4	2,4	2,2	3,5
	55-59 ans	5,1	8,4	2,4	16,8	2	6,9	2,4
	60-64 ans	5,1	7,8	2,8	4,7	2,1	8,2	2,9
	65-69 ans	6,5	7,5	5,7	12,6	6,5	6,9	5,6
	70-74 ans	7	9,6	4,7	5,4	4,3	10	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>7,5</b>	<b>3,6</b>	<b>8,2</b>	<b>2,8</b>	<b>7,3</b>	<b>3,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,3</b>	<b>7,4</b>	<b>3,4</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	3,9	1,8	5,5	1,4	1,5	2,4
	55-59 ans	4,4	7,5	1,9	14,7	0	6,1	2,1
	60-64 ans	4	6,9	1,6	4,7	2,1	7,3	1,6
	65-69 ans	4,9	4,9	4,8	9,4	6,5	4,4	4,7
	70-74 ans	5,1	7	3,5	5,4	4,3	7,1	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>6</b>	<b>2,6</b>	<b>7</b>	<b>1,9</b>	<b>5,7</b>	<b>2,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,2</b>	<b>6</b>	<b>2,5</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,2	2,1	6	1,9	1,5	2,4
	55-59 ans	4,7	8,1	1,9	14,7	0	6,9	2,1
	60-64 ans	4,3	7,2	1,9	4,7	2,1	7,6	1,9
	65-69 ans	6,1	6,9	5,4	9,4	6,5	6,6	5,3
	70-74 ans	7,2	10	4,7	10,9	4,3	10	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>7,1</b>	<b>3</b>	<b>7,6</b>	<b>2,2</b>	<b>6,9</b>	<b>3,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,9</b>	<b>7</b>	<b>2,9</b>	-	-	-	-

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,9	0,3	1	0,5	0,7	0
	55-59 ans	0,9	1	0,8	2,1	0	0,8	0,9
	60-64 ans	1,8	2,9	0,9	2,4	2,1	3	0,8
	65-69 ans	2,3	3,9	0,9	15,7	3,2	2,6	0,6
	70-74 ans	4,3	6,6	2,3	16,3	4,3	5,7	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0,9</b>	<b>3,5</b>	<b>1,1</b>	<b>2,6</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,7</b>	<b>2,6</b>	<b>0,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	33,3	50	0	50	0	0	0
	55-59 ans	66,7	66,7	66,7	0	0	100	66,7
	60-64 ans	76,9	70	100	100	100	66,7	100
	65-69 ans	73,3	66,7	100	80	100	57,1	100
	70-74 ans	70	64,3	83,3	100	100	58,3	80
	<b>50-74 ans</b>	<b>70,2</b>	<b>65,9</b>	<b>81,3</b>	<b>72,7</b>	<b>75</b>	<b>63,3</b>	<b>83,3</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)