

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8 445	3 874	4 571	2 519	2 837	1 355	1 734
	55-59 ans	9 149	4 012	5 137	793	953	3 219	4 184
	60-64 ans	9 691	4 444	5 247	665	759	3 779	4 488
	65-69 ans	7 786	3 586	4 200	345	413	3 241	3 787
	70-74 ans	5 073	2 369	2 704	180	215	2 189	2 489
	50-74 ans	40 144	18 285	21 859	4 502	5 177	13 783	16 682
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	549	257	292	166	194	91	98
	55-59 ans	637	263	374	62	77	201	297
	60-64 ans	696	303	393	50	75	253	318
	65-69 ans	636	283	353	29	54	254	299
	70-74 ans	415	169	246	13	20	156	226
	50-74 ans	2 933	1 275	1 658	320	420	955	1 238
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	359	174	185	108	113	66	72
	55-59 ans	455	192	263	34	43	158	220
	60-64 ans	516	230	286	32	38	198	248
	65-69 ans	445	200	245	14	26	186	219
	70-74 ans	303	123	180	7	8	116	172
	50-74 ans	2 078	919	1 159	195	228	724	931
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	190	83	107	58	81	25	26
	55-59 ans	182	71	111	28	34	43	77
	60-64 ans	180	73	107	18	37	55	70
	65-69 ans	191	83	108	15	28	68	80
	70-74 ans	112	46	66	6	12	40	54
	50-74 ans	855	356	499	125	192	231	307
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 255	3 791	4 464	2 461	2 756	1 330	1 708
	55-59 ans	8 967	3 941	5 026	765	919	3 176	4 107
	60-64 ans	9 511	4 371	5 140	647	722	3 724	4 418
	65-69 ans	7 595	3 503	4 092	330	385	3 173	3 707
	70-74 ans	4 960	2 323	2 637	174	203	2 149	2 434
	50-74 ans	39 288	17 929	21 359	4 377	4 985	13 552	16 374
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	170	88	82	59	43	29	39
	55-59 ans	209	110	99	16	13	94	86
	60-64 ans	251	117	134	23	16	94	118
	65-69 ans	231	121	110	10	13	111	97
	70-74 ans	183	84	99	3	8	81	91

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 044	520	524	111	93	409	431
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	170	88	82	59	43	29	39
	55-59 ans	207	109	98	16	13	93	85
	60-64 ans	247	115	132	23	16	92	116
	65-69 ans	231	121	110	10	13	111	97
	70-74 ans	179	84	95	3	8	81	87
	50-74 ans	1 034	517	517	111	93	406	424
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	139	71	68	49	36	22	32
	55-59 ans	189	99	90	14	13	85	77
	60-64 ans	218	99	119	18	12	81	107
	65-69 ans	201	102	99	8	13	94	86
	70-74 ans	149	68	81	3	7	65	74
	50-74 ans	896	439	457	92	81	347	376
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	136	69	67	48	35	21	32
	55-59 ans	183	96	87	14	12	82	75
	60-64 ans	206	94	112	18	12	76	100
	65-69 ans	195	98	97	8	13	90	84
	70-74 ans	145	65	80	3	7	62	73
	50-74 ans	865	422	443	91	79	331	364
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	138	70	68	49	36	21	32
	55-59 ans	188	99	89	14	12	85	77

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	211	96	115	18	12	78	103
	65-69 ans	200	101	99	8	13	93	86
	70-74 ans	148	67	81	3	7	64	74
	50-74 ans	885	433	452	92	80	341	372
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	7	3	4	0	0	3	4
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	6	5	0	1	6	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	139	71	68	49	36	22	32
	55-59 ans	188	98	90	14	13	84	77
	60-64 ans	217	98	119	18	12	80	107
	65-69 ans	200	102	98	8	13	94	85
	70-74 ans	149	68	81	3	7	65	74
	50-74 ans	893	437	456	92	81	345	375
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	139	71	68	49	36	22	32
	55-59 ans	189	99	90	14	13	85	77
	60-64 ans	220	99	121	18	12	81	109
	65-69 ans	201	102	99	8	13	94	86
	70-74 ans	150	68	82	3	8	65	74
	50-74 ans	899	439	460	92	82	347	378
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	78	31	47	23	25	8	22
	55-59 ans	98	42	56	6	5	36	51
	60-64 ans	120	42	78	7	8	35	70
	65-69 ans	102	43	59	5	5	38	54
	70-74 ans	63	22	41	0	5	22	36
	50-74 ans	461	180	281	41	48	139	233

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	8	4	4	2	1	2	3
	55-59 ans	24	12	12	1	5	11	7
	60-64 ans	19	10	9	2	2	8	7
	65-69 ans	17	5	12	0	2	5	10
	70-74 ans	11	7	4	0	0	7	4
	50-74 ans	79	38	41	5	10	33	31
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16	10	6	5	4	5	2
	55-59 ans	16	11	5	0	1	11	4
	60-64 ans	22	12	10	1	2	11	8
	65-69 ans	25	15	10	0	2	15	8
	70-74 ans	18	8	10	1	0	7	10
	50-74 ans	97	56	41	7	9	49	32
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17	12	5	11	4	1	1
	55-59 ans	24	18	6	3	2	15	4
	60-64 ans	39	23	16	4	0	19	16
	65-69 ans	33	26	7	3	2	23	5
	70-74 ans	30	18	12	1	2	17	10
	50-74 ans	143	97	46	22	10	75	36
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	7	4	3	3	0	1	3
	65-69 ans	10	9	1	0	1	9	0
	70-74 ans	14	7	7	0	0	7	7
	50-74 ans	42	27	15	5	2	22	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	1	7	0	1	1	6
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	5	0	3	0	2	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	17	10	7	4	0	6	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	12	5	7	1	0	4	7
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	33	22	11	16	8	6	3
	55-59 ans	40	29	11	3	3	26	8
	60-64 ans	61	35	26	5	2	30	24
	65-69 ans	58	41	17	3	4	38	13
	70-74 ans	48	26	22	2	2	24	20
	50-74 ans	240	153	87	29	19	124	68
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	17	12	5	11	4	1	1
	55-59 ans	24	18	6	3	2	15	4
	60-64 ans	39	23	16	4	0	19	16
	65-69 ans	33	26	7	3	2	23	5
	70-74 ans	30	18	12	1	2	17	10
	50-74 ans	143	97	46	22	10	75	36

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	16	12	4	11	3	1	1
	55-59 ans	21	16	5	3	2	13	3
	60-64 ans	29	17	12	3	0	14	12
	65-69 ans	24	18	6	3	2	15	4
	70-74 ans	28	17	11	1	2	16	9
	50-74 ans	118	80	38	21	9	59	29
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	17	12	5	11	4	1	1
	55-59 ans	22	16	6	3	2	13	4
	60-64 ans	34	21	13	4	0	17	13
	65-69 ans	29	21	8	3	2	18	6
	70-74 ans	29	17	12	1	2	16	10
	50-74 ans	131	87	44	22	10	65	34
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	7	4	3	3	0	1	3
	65-69 ans	10	9	1	0	1	9	0
	70-74 ans	14	7	7	0	0	7	7
	50-74 ans	42	27	15	5	2	22	13
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	7	4	3	3	0	1	3
	65-69 ans	10	9	1	0	1	9	0
	70-74 ans	14	7	7	0	0	7	7
	50-74 ans	42	27	15	5	2	22	13
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	15	10	5	3	1	7	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	7	7	0	0	0	7	0
	70-74 ans	10	4	6	0	0	4	6
	50-74 ans	27	17	10	2	1	15	9
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	16	12	4	2	0	10	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	11	5	6	0	1	5	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	9	9	0	0	0	9	0
	70-74 ans	10	4	6	0	0	4	6
	50-74 ans	30	20	10	2	1	18	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	27	15	12	9	7	6	5
	55-59 ans	14	9	5	2	0	7	5
	60-64 ans	23	15	8	4	3	11	5
	65-69 ans	23	15	8	2	0	13	8
	70-74 ans	21	13	8	0	0	13	8
	50-74 ans	108	67	41	17	10	50	31

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,5	6,6	6,4	6,6	6,8	6,7	5,7
	55-59 ans	7	6,6	7,3	7,8	8,1	6,2	7,1
	60-64 ans	7,2	6,8	7,5	7,5	9,9	6,7	7,1
	65-69 ans	8,2	7,9	8,4	8,4	13,1	7,8	7,9
	70-74 ans	8,2	7,1	9,1	7,2	9,3	7,1	9,1
	50-74 ans	7,3	7	7,6	7,1	8,1	6,9	7,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,1	2,3	2,3	2,9	1,8	1,5
	55-59 ans	2	1,8	2,2	3,5	3,6	1,3	1,8
	60-64 ans	1,9	1,6	2	2,7	4,9	1,5	1,6
	65-69 ans	2,5	2,3	2,6	4,3	6,8	2,1	2,1
	70-74 ans	2,2	1,9	2,4	3,3	5,6	1,8	2,2
	50-74 ans	2,1	1,9	2,3	2,8	3,7	1,7	1,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,4	67,7	63,4	65,1	58,2	72,5	73,5
	55-59 ans	71,4	73	70,3	54,8	55,8	78,6	74,1
	60-64 ans	74,1	75,9	72,8	64	50,7	78,3	78
	65-69 ans	70	70,7	69,4	48,3	48,1	73,2	73,2
	70-74 ans	73	72,8	73,2	53,8	40	74,4	76,1
	50-74 ans	70,8	72,1	69,9	60,9	54,3	75,8	75,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,3	1,8	2,4	1,6	2,2	2,3
	55-59 ans	2,3	2,8	2	2,1	1,4	3	2,1
	60-64 ans	2,6	2,7	2,6	3,6	2,2	2,5	2,7
	65-69 ans	3	3,5	2,7	3	3,4	3,5	2,6
	70-74 ans	3,7	3,6	3,8	1,7	3,9	3,8	3,7
	50-74 ans	2,7	2,9	2,5	2,5	1,9	3	2,6
50-74 ans **	2,6	2,9	2,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99	99,1	99	100	100	98,9	98,8
	60-64 ans	98,4	98,3	98,5	100	100	97,9	98,3
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	97,8	100	96	100	100	100	95,6
	50-74 ans	99	99,4	98,7	100	100	99,3	98,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,8	80,7	82,9	83,1	83,7	75,9	82,1
	55-59 ans	91,3	90,8	91,8	87,5	100	91,4	90,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	88,3	86,1	90,2	78,3	75	88	92,2
	65-69 ans	87	84,3	90	80	100	84,7	88,7
	70-74 ans	83,2	81	85,3	100	87,5	80,2	85,1
	50-74 ans	86,7	84,9	88,4	82,9	87,1	85,5	88,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,8	97,2	98,5	98	97,2	95,5	100
	55-59 ans	96,8	97	96,7	100	92,3	96,5	97,4
	60-64 ans	94,5	94,9	94,1	100	100	93,8	93,5
	65-69 ans	97	96,1	98	100	100	95,7	97,7
	70-74 ans	97,3	95,6	98,8	100	100	95,4	98,6
	50-74 ans	96,5	96,1	96,9	98,9	97,5	95,4	96,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	3	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	55-59 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	60-64 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-2)
	65-69 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	70-74 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-2)
	50-74 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	103	116	90	128	94	89	87
	55-59 ans	77	73	81	95	101	70	78
	60-64 ans	84	89	80	54	112	96	76
	65-69 ans	76	77	74	77	96	77	71
	70-74 ans	76	77	74	113	41	76	77
	50-74 ans	82	85	79	104	93	80	76
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70 (44-125)	79 (50-131)	63 (43-118,5)	80 (54-131)	59 (40-123)	74,5 (41-120)	64 (46,5-114,5)
	55-59 ans	58 (42-86)	58 (42-90)	59 (42-82)	71,5 (46-149)	47 (36-111)	58 (42-89)	59 (43-77)
	60-64 ans	59,5 (42-96)	59 (45-94)	60 (41-97)	45 (36-59)	70,5 (39-124)	64 (53-97)	58 (41-96)
	65-69 ans	61 (40-84)	63,5 (42-93)	57 (40-77)	51,5 (35,5-112)	65 (39-91)	64 (42-93)	57 (40-74)
	70-74 ans	60 (41-85)	60,5 (39-99,5)	60 (41-81)	97 (67-174)	38 (33-56)	59 (38-86)	62 (45-84)
	50-74 ans	61 (42-93)	63 (42-100)	60 (41-85)	68 (43-121,5)	58 (38-104)	62 (42-97)	60 (42-84)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	15,9	17	14,6	15,3	16,3	20,7	12,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6,7	8,2	5,1	12,5	0	7,4	5,8
	60-64 ans	9,2	12,8	6	17,4	18,8	11,7	4,2
	65-69 ans	10	12,4	7,3	20	0	11,7	8,2
	70-74 ans	11,5	15,5	8,1	0	0	16	8,8
	50-74 ans	10,3	12,9	7,8	15,3	10,8	12,2	7,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,5	99	100	100	100	98,8	100
	60-64 ans	99,5	99	100	100	100	98,8	100
	65-69 ans	99,5	100	99	100	100	100	98,8
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	99,5	99,8	100	100	99,4	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,1	43,7	69,1	46,9	69,4	36,4	68,8
	55-59 ans	51,9	42,4	62,2	42,9	38,5	42,4	66,2
	60-64 ans	54,5	42,4	64,5	38,9	66,7	43,2	64,2
	65-69 ans	50,7	42,2	59,6	62,5	38,5	40,4	62,8
	70-74 ans	42	32,4	50	0	62,5	33,8	48,6
	50-74 ans	51,3	41	61,1	44,6	58,5	40,1	61,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,8	5,6	5,9	4,1	2,8	9,1	9,4
	55-59 ans	12,7	12,1	13,3	7,1	38,5	12,9	9,1
	60-64 ans	8,6	10,1	7,4	11,1	16,7	9,9	6,4
	65-69 ans	8,5	4,9	12,1	0	15,4	5,3	11,6
	70-74 ans	7,3	10,3	4,9	0	0	10,8	5,4
	50-74 ans	8,8	8,7	8,9	5,4	12,2	9,5	8,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,4	1,4	1,5	2	0	0	3,1
	55-59 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,3
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,7	0	1,2	0	0	0	1,4
	50-74 ans	0,4	0,2	0,7	1,1	0	0	0,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,5	14,1	8,8	10,2	11,1	22,7	6,3
	55-59 ans	8,5	11,1	5,6	0	7,7	12,9	5,2
	60-64 ans	10	12,1	8,3	5,6	16,7	13,6	7,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	12,4	14,7	10,1	0	15,4	16	9,3
	70-74 ans	12	11,8	12,2	33,3	0	10,8	13,5
	50-74 ans	10,8	12,8	8,9	7,6	11	14,1	8,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,2	16,9	7,4	22,4	11,1	4,5	3,1
	55-59 ans	12,7	18,2	6,7	21,4	15,4	17,6	5,2
	60-64 ans	17,7	23,2	13,2	22,2	0	23,5	14,7
	65-69 ans	16,4	25,5	7,1	37,5	15,4	24,5	5,8
	70-74 ans	20	26,5	14,6	33,3	25	26,2	13,5
	50-74 ans	15,9	22,1	10	23,9	12,2	21,6	9,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,6	4,2	2,9	2	2,8	9,1	3,1
	55-59 ans	3,2	4	2,2	7,1	0	3,5	2,6
	60-64 ans	3,2	4	2,5	16,7	0	1,2	2,8
	65-69 ans	5	8,8	1	0	7,7	9,6	0
	70-74 ans	9,3	10,3	8,5	0	0	10,8	9,5
	50-74 ans	4,7	6,2	3,3	5,4	2,4	6,3	3,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,1	1	1,1	0	0	1,2	1,3
	60-64 ans	1,4	0	2,5	0	0	0	2,8
	65-69 ans	1,5	0	3	0	7,7	0	2,3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,9	0,2	1,5	0	1,2	0,3	1,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,6	7	0	6,1	0	9,1	0
	55-59 ans	1,6	2	1,1	0	0	2,4	1,3
	60-64 ans	0,9	1	0,8	5,6	0	0	0,9
	65-69 ans	2	1	3	0	0	1,1	3,5
	70-74 ans	2	1,5	2,4	0	0	1,5	2,7
	50-74 ans	1,9	2,3	1,5	4,3	0	1,7	1,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	1,4	0	0	0	4,5	0
	55-59 ans	2,6	3	2,2	7,1	0	2,4	2,6
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,5	0	3	0	0	0	3,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	1,5	2,4	0	0	1,5	2,7
	50-74 ans	1,3	1,1	1,5	1,1	0	1,2	1,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4	5,8	2,5	6,5	2,9	4,5	1,8
	55-59 ans	4,5	7,4	2,2	3,9	3,3	8,2	1,9
	60-64 ans	6,4	8	5,1	7,7	2,8	8,1	5,4
	65-69 ans	7,6	11,7	4,2	9,1	10,4	12	3,5
	70-74 ans	9,7	11,2	8,3	11,5	9,9	11,2	8,2
	50-74 ans	6,1	8,5	4,1	6,6	3,8	9,1	4,2
	50-74 ans **	6,1	8,3	4,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,2	1,1	4,5	1,5	0,8	0,6
	55-59 ans	2,7	4,6	1,2	3,9	2,2	4,7	1
	60-64 ans	4,1	5,3	3,1	6,2	0	5,1	3,6
	65-69 ans	4,3	7,4	1,7	9,1	5,2	7,2	1,3
	70-74 ans	6	7,7	4,6	5,7	9,9	7,9	4,1
	50-74 ans	3,6	5,4	2,2	5	2	5,5	2,2
	50-74 ans **	3,6	5,2	2,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	3,2	0,9	4,5	1,1	0,8	0,6
	55-59 ans	2,3	4,1	1	3,9	2,2	4,1	0,7
	60-64 ans	3	3,9	2,3	4,6	0	3,8	2,7
	65-69 ans	3,2	5,1	1,5	9,1	5,2	4,7	1,1
	70-74 ans	5,6	7,3	4,2	5,7	9,9	7,4	3,7
	50-74 ans	3	4,5	1,8	4,8	1,8	4,4	1,8
	50-74 ans **	3	4,4	1,8	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,2	1,1	4,5	1,5	0,8	0,6
	55-59 ans	2,5	4,1	1,2	3,9	2,2	4,1	1
	60-64 ans	3,6	4,8	2,5	6,2	0	4,6	2,9
	65-69 ans	3,8	6	2	9,1	5,2	5,7	1,6
	70-74 ans	5,8	7,3	4,6	5,7	9,9	7,4	4,1
	50-74 ans	3,3	4,9	2,1	5	2	4,8	2,1
	50-74 ans **	3,3	4,7	2,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,8	0,4	0,4	0,4	1,5	0,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,7	1	0,4	1,3	0	0,9	0,5
	60-64 ans	0,7	0,9	0,6	4,6	0	0,3	0,7
	65-69 ans	1,3	2,6	0,2	0	2,6	2,8	0
	70-74 ans	2,8	3	2,7	0	0	3,3	2,9
	50-74 ans	1,1	1,5	0,7	1,1	0,4	1,6	0,8
	50-74 ans **	1,1	1,4	0,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	40	66,7	0	100	0	50	0
	55-59 ans	66,7	50	100	100	0	33,3	100
	60-64 ans	28,6	25	33,3	33,3	0	0	33,3
	65-69 ans	30	22,2	100	0	100	22,2	0
	70-74 ans	28,6	42,9	14,3	0	0	42,9	14,3
	50-74 ans	35,7	37	33,3	60	50	31,8	30,8

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)