

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 24 - Région: CENTRE\_VAL\_DE\_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	939	505	434	318	262	187	172
	55-59 ans	871	482	389	114	87	368	302
	60-64 ans	1 078	549	529	133	124	416	405
	65-69 ans	977	503	474	110	82	393	392
	70-74 ans	752	392	360	74	65	318	295
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 617</b>	<b>2 431</b>	<b>2 186</b>	<b>749</b>	<b>620</b>	<b>1 682</b>	<b>1 566</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	942	506	436	319	262	187	174
	55-59 ans	874	483	391	115	87	368	304
	60-64 ans	1 083	549	534	133	124	416	410
	65-69 ans	989	509	480	110	82	399	398
	70-74 ans	761	397	364	76	67	321	297
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 649</b>	<b>2 444</b>	<b>2 205</b>	<b>753</b>	<b>622</b>	<b>1 691</b>	<b>1 583</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	477	219	258	130	155	89	103
	55-59 ans	384	175	209	36	46	139	163
	60-64 ans	450	179	271	41	55	138	216
	65-69 ans	418	161	257	31	44	130	213
	70-74 ans	291	111	180	22	39	89	141
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 020</b>	<b>845</b>	<b>1 175</b>	<b>260</b>	<b>339</b>	<b>585</b>	<b>836</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	81	50	31	33	14	17	17
	55-59 ans	69	45	24	11	3	34	21
	60-64 ans	70	42	28	15	4	27	24
	65-69 ans	54	30	24	4	5	26	19
	70-74 ans	48	18	30	2	1	16	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>322</b>	<b>185</b>	<b>137</b>	<b>65</b>	<b>27</b>	<b>120</b>	<b>110</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	132	82	50	47	29	35	21
	55-59 ans	142	93	49	25	14	68	35
	60-64 ans	183	109	74	22	21	87	53
	65-69 ans	168	94	74	20	10	74	64
	70-74 ans	133	83	50	12	8	71	42

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 24 - Région: CENTRE\_VAL\_DE\_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>758</b>	<b>461</b>	<b>297</b>	<b>126</b>	<b>82</b>	<b>335</b>	<b>215</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	143	94	49	58	37	36	12
	55-59 ans	158	106	52	30	15	76	37
	60-64 ans	203	120	83	31	21	89	62
	65-69 ans	199	126	73	28	15	98	58
	70-74 ans	149	96	53	20	9	76	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>852</b>	<b>542</b>	<b>310</b>	<b>167</b>	<b>97</b>	<b>375</b>	<b>213</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	32	20	12	18	9	2	3
	55-59 ans	48	28	20	8	4	20	16
	60-64 ans	81	49	32	12	9	37	23
	65-69 ans	88	65	23	20	6	45	17
	70-74 ans	92	62	30	14	7	48	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>341</b>	<b>224</b>	<b>117</b>	<b>72</b>	<b>35</b>	<b>152</b>	<b>82</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	20	11	9	10	3	1	6
	55-59 ans	20	8	12	1	3	7	9
	60-64 ans	30	13	17	3	5	10	12
	65-69 ans	21	12	9	4	2	8	7
	70-74 ans	15	9	6	3	0	6	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>106</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>40</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	19	9	10	6	7	3	3
	55-59 ans	16	11	5	3	2	8	3
	60-64 ans	23	12	11	6	5	6	6
	65-69 ans	18	9	9	2	0	7	9
	70-74 ans	16	11	5	3	1	8	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>52</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>25</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	1	3	1	1	0	2
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	275	176	99	105	66	71	33
	55-59 ans	300	199	101	55	29	144	72

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 24 - Région: CENTRE\_VAL\_DE\_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	386	229	157	53	42	176	115
	65-69 ans	367	220	147	48	25	172	122
	70-74 ans	282	179	103	32	17	147	86
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 610</b>	<b>1 003</b>	<b>607</b>	<b>293</b>	<b>179</b>	<b>710</b>	<b>428</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	143	94	49	58	37	36	12
	55-59 ans	158	106	52	30	15	76	37
	60-64 ans	203	120	83	31	21	89	62
	65-69 ans	199	126	73	28	15	98	58
	70-74 ans	149	96	53	20	9	76	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>852</b>	<b>542</b>	<b>310</b>	<b>167</b>	<b>97</b>	<b>375</b>	<b>213</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	113	74	39	46	30	28	9
	55-59 ans	120	83	37	25	11	58	26
	60-64 ans	154	94	60	27	16	67	44
	65-69 ans	150	92	58	22	12	70	46
	70-74 ans	98	66	32	14	6	52	26
	<b>50-74 ans</b>	<b>635</b>	<b>409</b>	<b>226</b>	<b>134</b>	<b>75</b>	<b>275</b>	<b>151</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	129	86	43	54	34	32	9
	55-59 ans	156	111	45	33	12	78	33
	60-64 ans	183	115	68	31	16	84	52
	65-69 ans	183	115	68	27	14	88	54
	70-74 ans	135	91	44	19	7	72	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>786</b>	<b>518</b>	<b>268</b>	<b>164</b>	<b>83</b>	<b>354</b>	<b>185</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	33	21	12	18	9	3	3
	55-59 ans	48	28	20	8	4	20	16
	60-64 ans	81	49	32	12	9	37	23
	65-69 ans	88	65	23	20	6	45	17
	70-74 ans	94	62	32	14	7	48	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>344</b>	<b>225</b>	<b>119</b>	<b>72</b>	<b>35</b>	<b>153</b>	<b>84</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,7	99,8	99,5	99,7	100,0	100,0	98,9
	55-59 ans	99,8	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0	99,3
	60-64 ans	99,9	100,0	99,8	100,0	100,0	100,0	99,8
	65-69 ans	99,2	99,4	99,0	100,0	100,0	99,2	98,7
	70-74 ans	99,5	99,7	99,2	100,0	98,5	99,7	99,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,8</b>	<b>99,4</b>	<b>99,9</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>	<b>99,2</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50,6	43,3	59,2	40,8	59,2	47,6	59,2
	55-59 ans	43,9	36,2	53,5	31,3	52,9	37,8	53,6
	60-64 ans	41,6	32,6	50,7	30,8	44,4	33,2	52,7
	65-69 ans	42,3	31,6	53,5	28,2	53,7	32,6	53,5
	70-74 ans	38,2	28,0	49,5	28,9	58,2	27,7	47,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>43,5</b>	<b>34,6</b>	<b>53,3</b>	<b>34,5</b>	<b>54,5</b>	<b>34,6</b>	<b>52,8</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,6	9,9	7,1	10,3	5,3	9,1	9,8
	55-59 ans	7,9	9,3	6,1	9,6	3,4	9,2	6,9
	60-64 ans	6,5	7,7	5,2	11,3	3,2	6,5	5,9
	65-69 ans	5,5	5,9	5,0	3,6	6,1	6,5	4,8
	70-74 ans	6,3	4,5	8,2	2,6	1,5	5,0	9,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>7,6</b>	<b>6,2</b>	<b>8,6</b>	<b>4,3</b>	<b>7,1</b>	<b>6,9</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,2	0,5	0,3	0,8	0,0	0,0
	55-59 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	60-64 ans	0,4	0,7	0,0	0,8	0,0	0,7	0,0
	65-69 ans	0,2	0,4	0,0	0,9	0,0	0,3	0,0
	70-74 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,0	16,2	11,5	14,7	11,1	18,7	12,1
	55-59 ans	16,2	19,3	12,5	21,7	16,1	18,5	11,5
	60-64 ans	16,9	19,9	13,9	16,5	16,9	20,9	12,9
	65-69 ans	17,0	18,5	15,4	18,2	12,2	18,5	16,1
	70-74 ans	17,5	20,9	13,7	15,8	11,9	22,1	14,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,3</b>	<b>18,9</b>	<b>13,5</b>	<b>16,7</b>	<b>13,2</b>	<b>19,8</b>	<b>13,6</b>

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	15,2	18,6	11,2	18,2	14,1	19,3	6,9
	55-59 ans	18,1	21,9	13,3	26,1	17,2	20,7	12,2
	60-64 ans	18,7	21,9	15,5	23,3	16,9	21,4	15,1
	65-69 ans	20,1	24,8	15,2	25,5	18,3	24,6	14,6
	70-74 ans	19,6	24,2	14,6	26,3	13,4	23,7	14,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,3</b>	<b>22,2</b>	<b>14,1</b>	<b>22,2</b>	<b>15,6</b>	<b>22,2</b>	<b>13,5</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,4	4,0	2,8	5,6	3,4	1,1	1,7
	55-59 ans	5,5	5,8	5,1	7,0	4,6	5,4	5,3
	60-64 ans	7,5	8,9	6,0	9,0	7,3	8,9	5,6
	65-69 ans	8,9	12,8	4,8	18,2	7,3	11,3	4,3
	70-74 ans	12,1	15,6	8,2	18,4	10,4	15,0	7,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,3</b>	<b>9,2</b>	<b>5,3</b>	<b>9,6</b>	<b>5,6</b>	<b>9,0</b>	<b>5,2</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,1	2,2	2,1	3,1	1,1	0,5	3,4
	55-59 ans	2,3	1,7	3,1	0,9	3,4	1,9	3,0
	60-64 ans	2,8	2,4	3,2	2,3	4,0	2,4	2,9
	65-69 ans	2,1	2,4	1,9	3,6	2,4	2,0	1,8
	70-74 ans	2,0	2,3	1,6	3,9	0,0	1,9	2,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>2,5</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,0	1,8	2,3	1,9	2,7	1,6	1,7
	55-59 ans	1,8	2,3	1,3	2,6	2,3	2,2	1,0
	60-64 ans	2,1	2,2	2,1	4,5	4,0	1,4	1,5
	65-69 ans	1,8	1,8	1,9	1,8	0,0	1,8	2,3
	70-74 ans	2,1	2,8	1,4	3,9	1,5	2,5	1,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9</b>	<b>1,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,2	0,7	0,3	0,4	0,0	1,1
	55-59 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3
	70-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,1	7,1	3,4	7,0	4,1	7,3	2,6
	55-59 ans	6,3	9,3	3,9	11,6	5,8	8,6	3,4
	60-64 ans	7,0	9,2	5,1	10,7	7,9	8,8	4,5
	65-69 ans	8,0	10,6	5,9	14,0	6,9	9,9	5,7
	70-74 ans	8,3	11,8	5,5	15,4	7,0	11,2	5,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>9,4</b>	<b>4,7</b>	<b>9,7</b>	<b>5,5</b>	<b>9,2</b>	<b>4,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,8</b>	<b>9,3</b>	<b>4,6</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	3,8	1,7	3,9	2,3	3,7	1,0
	55-59 ans	3,3	5,0	2,0	6,4	3,0	4,6	1,7
	60-64 ans	3,7	4,8	2,7	6,3	3,9	4,5	2,5
	65-69 ans	4,3	6,0	2,9	8,2	4,1	5,6	2,7
	70-74 ans	4,4	6,3	2,8	9,6	3,7	5,8	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>5,1</b>	<b>2,4</b>	<b>5,5</b>	<b>3,0</b>	<b>4,9</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,6</b>	<b>5,0</b>	<b>2,3</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,0	1,4	3,1	1,8	2,9	0,7
	55-59 ans	2,5	3,9	1,4	5,3	2,2	3,5	1,2
	60-64 ans	2,8	3,8	2,0	5,5	3,0	3,4	1,7
	65-69 ans	3,3	4,4	2,3	6,4	3,3	4,0	2,2
	70-74 ans	2,9	4,3	1,7	6,8	2,5	4,0	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>3,8</b>	<b>1,8</b>	<b>4,4</b>	<b>2,3</b>	<b>3,6</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,7</b>	<b>3,8</b>	<b>1,7</b>	.	.	.	.
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,5	1,5	3,6	2,1	3,3	0,7
	55-59 ans	3,3	5,2	1,7	7,0	2,4	4,7	1,6
	60-64 ans	3,3	4,6	2,2	6,3	3,0	4,2	2,1
	65-69 ans	4,0	5,5	2,7	7,9	3,8	5,1	2,5
	70-74 ans	4,0	6,0	2,4	9,2	2,9	5,5	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>4,8</b>	<b>2,1</b>	<b>5,4</b>	<b>2,5</b>	<b>4,6</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,3</b>	<b>4,8</b>	<b>2,0</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,8	0,4	1,2	0,6	0,3	0,2
	55-59 ans	1,0	1,3	0,8	1,7	0,8	1,2	0,8
	60-64 ans	1,5	2,0	1,0	2,4	1,7	1,9	0,9
	65-69 ans	1,9	3,1	0,9	5,8	1,6	2,6	0,8
	70-74 ans	2,8	4,1	1,7	6,8	2,9	3,7	1,5

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>2,1</b>	<b>0,9</b>	<b>2,4</b>	<b>1,1</b>	<b>2,0</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,9</b>	.	.	.	.

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)