

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 76 - Région: LANGUEDOC_ROUSSILLON_MIDI_PYRENEES

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	83 485	39 161	44 324	25 546	27 144	13 615	17 180
	55-59 ans	74 722	33 717	41 005	9 798	10 279	23 919	30 726
	60-64 ans	88 423	39 608	48 815	10 322	10 956	29 286	37 859
	65-69 ans	77 419	35 200	42 219	7 544	7 672	27 656	34 547
	70-74 ans	56 687	26 141	30 546	4 646	4 915	21 495	25 631
	50-74 ans	380 736	173 827	206 909	57 856	60 966	115 971	145 943
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	5 718	2 854	2 864	1 978	1 970	876	894
	55-59 ans	4 936	2 367	2 569	825	821	1 542	1 748
	60-64 ans	5 648	2 610	3 038	845	825	1 765	2 213
	65-69 ans	5 128	2 380	2 748	643	654	1 737	2 094
	70-74 ans	4 476	1 985	2 491	471	506	1 514	1 985
	50-74 ans	25 906	12 196	13 710	4 762	4 776	7 434	8 934
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	3 492	1 747	1 745	1 110	1 111	637	634
	55-59 ans	3 256	1 594	1 662	456	430	1 138	1 232
	60-64 ans	3 895	1 815	2 080	501	447	1 314	1 633
	65-69 ans	3 533	1 647	1 886	360	355	1 287	1 531
	70-74 ans	2 997	1 328	1 669	240	276	1 088	1 393
	50-74 ans	17 173	8 131	9 042	2 667	2 619	5 464	6 423
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	2 226	1 107	1 119	868	859	239	260
	55-59 ans	1 680	773	907	369	391	404	516
	60-64 ans	1 753	795	958	344	378	451	580
	65-69 ans	1 595	733	862	283	299	450	563
	70-74 ans	1 479	657	822	231	230	426	592
	50-74 ans	8 733	4 065	4 668	2 095	2 157	1 970	2 511
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	81 259	38 054	43 205	24 678	26 285	13 376	16 920
	55-59 ans	73 042	32 944	40 098	9 429	9 888	23 515	30 210
	60-64 ans	86 670	38 813	47 857	9 978	10 578	28 835	37 279
	65-69 ans	75 824	34 467	41 357	7 261	7 373	27 206	33 984
	70-74 ans	55 208	25 484	29 724	4 415	4 685	21 069	25 039
	50-74 ans	372 003	169 762	202 241	55 761	58 809	114 001	143 432
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 549	823	726	535	484	288	242
	55-59 ans	1 514	808	706	244	203	564	503
	60-64 ans	1 949	978	971	302	254	676	717

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 76 - Région: LANGUEDOC_ROUSSILLON_MIDI_PYRENEES

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1 900	985	915	213	184	772	731
	70-74 ans	1 499	798	701	156	128	642	573
	50-74 ans	8 411	4 392	4 019	1 450	1 253	2 942	2 766
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 539	816	723	530	482	286	241
	55-59 ans	1 505	804	701	242	201	562	500
	60-64 ans	1 934	967	967	300	254	667	713
	65-69 ans	1 879	971	908	208	184	763	724
	70-74 ans	1 479	783	696	149	128	634	568
	50-74 ans	8 336	4 341	3 995	1 429	1 249	2 912	2 746
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 139	603	536	369	334	234	202
	55-59 ans	1 169	620	549	170	148	450	401
	60-64 ans	1 540	773	767	218	189	555	578
	65-69 ans	1 554	791	763	149	146	642	617
	70-74 ans	1 205	632	573	110	96	522	477
	50-74 ans	6 607	3 419	3 188	1 016	913	2 403	2 275
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 022	546	476	338	298	208	178
	55-59 ans	1 051	561	490	149	133	412	357
	60-64 ans	1 396	699	697	187	173	512	524
	65-69 ans	1 386	705	681	133	130	572	551
	70-74 ans	1 054	557	497	92	76	465	421
	50-74 ans	5 909	3 068	2 841	899	810	2 169	2 031
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	14	7	7	4	3	3	4
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	3	4	2	1	1	3

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 131	600	531	369	330	231	201
	55-59 ans	1 160	616	544	169	147	447	397
	60-64 ans	1 527	768	759	216	187	552	572
	65-69 ans	1 536	781	755	146	144	635	611
	70-74 ans	1 193	623	570	109	94	514	476
	50-74 ans	6 547	3 388	3 159	1 009	902	2 379	2 257
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	8	3	5	0	4	3	1
	55-59 ans	9	4	5	1	1	3	4
	60-64 ans	13	5	8	2	2	3	6
	65-69 ans	18	10	8	3	2	7	6
	70-74 ans	12	9	3	1	2	8	1
	50-74 ans	60	31	29	7	11	24	18
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	4	2	2	2	0	0	2
	65-69 ans	7	2	5	0	0	2	5
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	50-74 ans	21	12	9	5	1	7	8

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 76 - Région: LANGUEDOC_ROUSSILLON_MIDI_PYRENEES

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,8	7,3	6,5	7,7	7,3	6,4	5,2
	55-59 ans	6,6	7,0	6,3	8,4	8,0	6,4	5,7
	60-64 ans	6,4	6,6	6,2	8,2	7,5	6,0	5,8
	65-69 ans	6,6	6,8	6,5	8,5	8,5	6,3	6,1
	70-74 ans	7,9	7,6	8,2	10,1	10,3	7,0	7,7
	50-74 ans	6,8	7,0	6,6	8,2	7,8	6,4	6,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,7	2,8	2,5	3,4	3,2	1,8	1,5
	55-59 ans	2,2	2,3	2,2	3,8	3,8	1,7	1,7
	60-64 ans	2,0	2,0	2,0	3,3	3,5	1,5	1,5
	65-69 ans	2,1	2,1	2,0	3,8	3,9	1,6	1,6
	70-74 ans	2,6	2,5	2,7	5,0	4,7	2,0	2,3
	50-74 ans	2,3	2,3	2,3	3,6	3,5	1,7	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	61,1	61,2	60,9	56,1	56,4	72,7	70,9
	55-59 ans	66,0	67,3	64,7	55,3	52,4	73,8	70,5
	60-64 ans	69,0	69,5	68,5	59,3	54,2	74,4	73,8
	65-69 ans	68,9	69,2	68,6	56,0	54,3	74,1	73,1
	70-74 ans	67,0	66,9	67,0	51,0	54,5	71,9	70,2
	50-74 ans	66,3	66,7	66,0	56,0	54,8	73,5	71,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,2	1,7	2,2	1,8	2,2	1,4
	55-59 ans	2,1	2,5	1,8	2,6	2,1	2,4	1,7
	60-64 ans	2,2	2,5	2,0	3,0	2,4	2,3	1,9
	65-69 ans	2,5	2,9	2,2	2,9	2,5	2,8	2,2
	70-74 ans	2,7	3,1	2,4	3,5	2,7	3,0	2,3
	50-74 ans	2,3	2,6	2,0	2,6	2,1	2,6	1,9
50-74 ans **	2,2	2,5	2,0	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,1	99,6	99,1	99,6	99,3	99,6
	55-59 ans	99,4	99,5	99,3	99,2	99,0	99,6	99,4
	60-64 ans	99,2	98,9	99,6	99,3	100,0	98,7	99,4
	65-69 ans	98,9	98,6	99,2	97,7	100,0	98,8	99,0
	70-74 ans	98,7	98,1	99,3	95,5	100,0	98,8	99,1

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,1	98,8	99,4	98,6	99,7	99,0	99,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	74,0	73,9	74,1	69,6	69,3	81,8	83,8
	55-59 ans	77,7	77,1	78,3	70,2	73,6	80,1	80,2
	60-64 ans	79,6	79,9	79,3	72,7	74,4	83,2	81,1
	65-69 ans	82,7	81,5	84,0	71,6	79,3	84,1	85,2
	70-74 ans	81,5	80,7	82,3	73,8	75,0	82,3	84,0
	50-74 ans	79,3	78,8	79,8	71,1	73,1	82,5	82,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,7	90,5	88,8	91,6	89,2	88,9	88,1
	55-59 ans	89,9	90,5	89,3	87,6	89,9	91,6	89,0
	60-64 ans	90,6	90,4	90,9	85,8	91,5	92,3	90,7
	65-69 ans	89,2	89,1	89,3	89,3	89,0	89,1	89,3
	70-74 ans	87,5	88,1	86,7	83,6	79,2	89,1	88,3
	50-74 ans	89,4	89,7	89,1	88,5	88,7	90,3	89,3

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)