

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 4679 | 2174 | 2505 | 1240 | 1364 | 934 | 1141 |
| | 55-59 ans | 4459 | 1961 | 2498 | 371 | 423 | 1590 | 2075 |
| | 60-64 ans | 5826 | 2595 | 3231 | 482 | 537 | 2113 | 2694 |
| | 65-69 ans | 4354 | 2030 | 2324 | 285 | 322 | 1745 | 2002 |
| | 70-74 ans | 3814 | 1673 | 2141 | 206 | 243 | 1467 | 1898 |
| | 50-74 ans | 23132 | 10433 | 12699 | 2584 | 2889 | 7849 | 9810 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 202 | 92 | 110 | 57 | 66 | 35 | 44 |
| | 55-59 ans | 223 | 100 | 123 | 25 | 30 | 75 | 93 |
| | 60-64 ans | 255 | 114 | 141 | 30 | 35 | 84 | 106 |
| | 65-69 ans | 229 | 98 | 131 | 20 | 29 | 78 | 102 |
| | 70-74 ans | 239 | 110 | 129 | 28 | 26 | 82 | 103 |
| | 50-74 ans | 1148 | 514 | 634 | 160 | 186 | 354 | 448 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 130 | 65 | 65 | 36 | 34 | 29 | 31 |
| | 55-59 ans | 156 | 68 | 88 | 13 | 17 | 55 | 71 |
| | 60-64 ans | 196 | 86 | 110 | 16 | 23 | 70 | 87 |
| | 65-69 ans | 167 | 67 | 100 | 8 | 20 | 59 | 80 |
| | 70-74 ans | 177 | 80 | 97 | 18 | 19 | 62 | 78 |
| | 50-74 ans | 826 | 366 | 460 | 91 | 113 | 275 | 347 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 72 | 27 | 45 | 21 | 32 | 6 | 13 |
| | 55-59 ans | 67 | 32 | 35 | 12 | 13 | 20 | 22 |
| | 60-64 ans | 59 | 28 | 31 | 14 | 12 | 14 | 19 |
| | 65-69 ans | 62 | 31 | 31 | 12 | 9 | 19 | 22 |
| | 70-74 ans | 62 | 30 | 32 | 10 | 7 | 20 | 25 |
| | 50-74 ans | 322 | 148 | 174 | 69 | 73 | 79 | 101 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 4607 | 2147 | 2460 | 1219 | 1332 | 928 | 1128 |
| | 55-59 ans | 4392 | 1929 | 2463 | 359 | 410 | 1570 | 2053 |
| | 60-64 ans | 5767 | 2567 | 3200 | 468 | 525 | 2099 | 2675 |
| | 65-69 ans | 4292 | 1999 | 2293 | 273 | 313 | 1726 | 1980 |
| | 70-74 ans | 3752 | 1643 | 2109 | 196 | 236 | 1447 | 1873 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 22810 | 10285 | 12525 | 2515 | 2816 | 7770 | 9709 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 97 | 55 | 42 | 33 | 28 | 22 | 14 |
| | 55-59 ans | 99 | 48 | 51 | 14 | 9 | 34 | 42 |
| | 60-64 ans | 136 | 76 | 60 | 20 | 12 | 56 | 48 |
| | 65-69 ans | 95 | 42 | 53 | 7 | 5 | 35 | 48 |
| | 70-74 ans | 117 | 56 | 61 | 5 | 8 | 51 | 53 |
| | 50-74 ans | 544 | 277 | 267 | 79 | 62 | 198 | 205 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 96 | 54 | 42 | 32 | 28 | 22 | 14 |
| | 55-59 ans | 99 | 48 | 51 | 14 | 9 | 34 | 42 |
| | 60-64 ans | 135 | 75 | 60 | 20 | 12 | 55 | 48 |
| | 65-69 ans | 94 | 41 | 53 | 6 | 5 | 35 | 48 |
| | 70-74 ans | 116 | 55 | 61 | 5 | 8 | 50 | 53 |
| | 50-74 ans | 540 | 273 | 267 | 77 | 62 | 196 | 205 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 92 | 51 | 41 | 30 | 27 | 21 | 14 |
| | 55-59 ans | 93 | 45 | 48 | 12 | 8 | 33 | 40 |
| | 60-64 ans | 125 | 70 | 55 | 20 | 11 | 50 | 44 |
| | 65-69 ans | 92 | 40 | 52 | 5 | 5 | 35 | 47 |
| | 70-74 ans | 107 | 51 | 56 | 5 | 7 | 46 | 49 |
| | 50-74 ans | 509 | 257 | 252 | 72 | 58 | 185 | 194 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 92 | 51 | 41 | 30 | 27 | 21 | 14 |
| | 55-59 ans | 90 | 42 | 48 | 10 | 8 | 32 | 40 |
| | 60-64 ans | 119 | 66 | 53 | 18 | 10 | 48 | 43 |
| | 65-69 ans | 89 | 37 | 52 | 4 | 5 | 33 | 47 |
| | 70-74 ans | 103 | 50 | 53 | 5 | 5 | 45 | 48 |
| | 50-74 ans | 493 | 246 | 247 | 67 | 55 | 179 | 192 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 92 | 51 | 41 | 30 | 27 | 21 | 14 |
| | 55-59 ans | 92 | 44 | 48 | 11 | 8 | 33 | 40 |
| | 60-64 ans | 124 | 69 | 55 | 20 | 11 | 49 | 44 |
| | 65-69 ans | 91 | 39 | 52 | 5 | 5 | 34 | 47 |
| | 70-74 ans | 105 | 51 | 54 | 5 | 5 | 46 | 49 |
| | 50-74 ans | 504 | 254 | 250 | 71 | 56 | 183 | 194 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|--|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
| | | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | | 50-54 ans | 92 | 51 | 41 | 30 | 27 | 21 | 14 |
| | | 55-59 ans | 92 | 45 | 47 | 12 | 7 | 33 | 40 |
| | | 60-64 ans | 124 | 69 | 55 | 20 | 11 | 49 | 44 |
| | | 65-69 ans | 92 | 40 | 52 | 5 | 5 | 35 | 47 |
| | | 70-74 ans | 106 | 51 | 55 | 5 | 6 | 46 | 49 |
| | | 50-74 ans | 506 | 256 | 250 | 72 | 56 | 184 | 194 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | | 50-54 ans | 92 | 51 | 41 | 30 | 27 | 21 | 14 |
| | | 55-59 ans | 93 | 45 | 48 | 12 | 8 | 33 | 40 |
| | | 60-64 ans | 126 | 71 | 55 | 20 | 11 | 51 | 44 |
| | | 65-69 ans | 92 | 40 | 52 | 5 | 5 | 35 | 47 |
| | | 70-74 ans | 108 | 52 | 56 | 5 | 7 | 47 | 49 |
| | | 50-74 ans | 511 | 259 | 252 | 72 | 58 | 187 | 194 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | | 50-54 ans | 50 | 24 | 26 | 16 | 18 | 8 | 8 |
| | | 55-59 ans | 49 | 20 | 29 | 3 | 3 | 17 | 26 |
| | | 60-64 ans | 57 | 29 | 28 | 5 | 6 | 24 | 22 |
| | | 65-69 ans | 39 | 11 | 28 | 1 | 4 | 10 | 24 |
| | | 70-74 ans | 46 | 16 | 30 | 0 | 4 | 16 | 26 |
| | | 50-74 ans | 241 | 100 | 141 | 25 | 35 | 75 | 106 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 60-64 ans | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| | | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | | 70-74 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | | 50-74 ans | 20 | 11 | 9 | 3 | 3 | 8 | 6 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| | 55-59 ans | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| | 60-64 ans | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| | 65-69 ans | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| | 70-74 ans | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| | 50-74 ans | 61 | 29 | 32 | 10 | 5 | 19 | 27 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 19 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| | 55-59 ans | 21 | 14 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 |
| | 60-64 ans | 27 | 15 | 12 | 6 | 1 | 9 | 11 |
| | 65-69 ans | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| | 70-74 ans | 23 | 14 | 9 | 2 | 1 | 12 | 8 |
| | 50-74 ans | 112 | 68 | 44 | 19 | 8 | 49 | 36 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 16 | 11 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| | 65-69 ans | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| | 70-74 ans | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| | 50-74 ans | 52 | 38 | 14 | 13 | 2 | 25 | 12 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 28 | 17 | 11 | 9 | 6 | 8 | 5 |
| | 55-59 ans | 30 | 17 | 13 | 6 | 2 | 11 | 11 |
| | 60-64 ans | 41 | 23 | 18 | 9 | 2 | 14 | 16 |
| | 65-69 ans | 34 | 17 | 17 | 1 | 1 | 16 | 16 |
| | 70-74 ans | 40 | 23 | 17 | 4 | 2 | 19 | 15 |
| | 50-74 ans | 173 | 97 | 76 | 29 | 13 | 68 | 63 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 19 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 21 | 14 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 |
| | 60-64 ans | 27 | 15 | 12 | 6 | 1 | 9 | 11 |
| | 65-69 ans | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| | 70-74 ans | 23 | 14 | 9 | 2 | 1 | 12 | 8 |
| | 50-74 ans | 112 | 68 | 44 | 19 | 8 | 49 | 36 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 18 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| | 55-59 ans | 16 | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 |
| | 60-64 ans | 23 | 12 | 11 | 4 | 1 | 8 | 10 |
| | 65-69 ans | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| | 70-74 ans | 21 | 12 | 9 | 1 | 1 | 11 | 8 |
| | 50-74 ans | 99 | 59 | 40 | 14 | 8 | 45 | 32 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 18 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| | 55-59 ans | 20 | 13 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| | 60-64 ans | 25 | 14 | 11 | 4 | 1 | 10 | 10 |
| | 65-69 ans | 23 | 13 | 10 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| | 70-74 ans | 23 | 14 | 9 | 1 | 1 | 13 | 8 |
| | 50-74 ans | 109 | 65 | 44 | 16 | 8 | 49 | 36 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 16 | 11 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| | 65-69 ans | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| | 70-74 ans | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| | 50-74 ans | 52 | 38 | 14 | 13 | 2 | 25 | 12 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 15 | 10 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| | 65-69 ans | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| | 70-74 ans | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| | 50-74 ans | 47 | 34 | 13 | 11 | 2 | 23 | 11 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 15 | 10 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| | 65-69 ans | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| | 70-74 ans | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| | 50-74 ans | 47 | 34 | 13 | 11 | 2 | 23 | 11 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| | 50-74 ans | 31 | 27 | 4 | 11 | 2 | 16 | 2 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 9 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 50-74 ans | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 15 | 10 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| | 65-69 ans | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| | 50-74 ans | 47 | 34 | 13 | 11 | 2 | 23 | 11 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| | 50-74 ans | 25 | 12 | 13 | 5 | 4 | 7 | 9 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 3,7 | 3,9 |
| | 55-59 ans | 5 | 5,1 | 4,9 | 6,7 | 7,1 | 4,7 | 4,5 |
| | 60-64 ans | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 6,2 | 6,5 | 4 | 3,9 |
| | 65-69 ans | 5,3 | 4,8 | 5,6 | 7 | 9 | 4,5 | 5,1 |
| | 70-74 ans | 6,3 | 6,6 | 6 | 13,6 | 10,7 | 5,6 | 5,4 |
| | 50-74 ans | 5 | 4,9 | 5 | 6,2 | 6,4 | 4,5 | 4,6 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 2,3 | 0,6 | 1,1 |
| | 55-59 ans | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 3,2 | 3,1 | 1,3 | 1,1 |
| | 60-64 ans | 1 | 1,1 | 1 | 2,9 | 2,2 | 0,7 | 0,7 |
| | 65-69 ans | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 4,2 | 2,8 | 1,1 | 1,1 |
| | 70-74 ans | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 4,9 | 2,9 | 1,4 | 1,3 |
| | 50-74 ans | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,7 | 2,5 | 1 | 1 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 64,4 | 70,7 | 59,1 | 63,2 | 51,5 | 82,9 | 70,5 |
| | 55-59 ans | 70 | 68 | 71,5 | 52 | 56,7 | 73,3 | 76,3 |
| | 60-64 ans | 76,9 | 75,4 | 78 | 53,3 | 65,7 | 83,3 | 82,1 |
| | 65-69 ans | 72,9 | 68,4 | 76,3 | 40 | 69 | 75,6 | 78,4 |
| | 70-74 ans | 74,1 | 72,7 | 75,2 | 64,3 | 73,1 | 75,6 | 75,7 |
| | 50-74 ans | 72 | 71,2 | 72,6 | 56,9 | 60,8 | 77,7 | 77,5 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 2,1 | 2,6 | 1,7 | 2,7 | 2,1 | 2,4 | 1,2 |
| | 55-59 ans | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 3,9 | 2,2 | 2,2 | 2 |
| | 60-64 ans | 2,4 | 3 | 1,9 | 4,3 | 2,3 | 2,7 | 1,8 |
| | 65-69 ans | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 1,6 | 2 | 2,4 |
| | 70-74 ans | 3,1 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 3,4 | 3,5 | 2,8 |
| | 50-74 ans | 2,4 | 2,7 | 2,1 | 3,1 | 2,2 | 2,5 | 2,1 |
| 50-74 ans** | 2,4 | 2,7 | 2,1 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 99 | 98,2 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 99,3 | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 98,2 | 100 |
| | 65-69 ans | 98,9 | 97,6 | 100 | 85,7 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 99,1 | 98,2 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,3 | 98,6 | 100 | 97,5 | 100 | 99 | 100 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 95,8 | 94,4 | 97,6 | 93,8 | 96,4 | 95,5 | 100 |
| | 55-59 ans | 93,9 | 93,8 | 94,1 | 85,7 | 88,9 | 97,1 | 95,2 |
| | 60-64 ans | 92,6 | 93,3 | 91,7 | 100 | 91,7 | 90,9 | 91,7 |
| | 65-69 ans | 97,9 | 97,6 | 98,1 | 83,3 | 100 | 100 | 97,9 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 92,2 | 92,7 | 91,8 | 100 | 87,5 | 92 | 92,5 |
| | 50-74 ans | 94,3 | 94,1 | 94,4 | 93,5 | 93,5 | 94,4 | 94,6 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 96,8 | 93,3 | 100 | 83,3 | 100 | 97 | 100 |
| | 60-64 ans | 95,2 | 94,3 | 96,4 | 90 | 90,9 | 96 | 97,7 |
| | 65-69 ans | 96,7 | 92,5 | 100 | 80 | 100 | 94,3 | 100 |
| | 70-74 ans | 96,3 | 98 | 94,6 | 100 | 71,4 | 97,8 | 98 |
| | 50-74 ans | 96,9 | 95,7 | 98 | 93,1 | 94,8 | 96,8 | 99 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 55-59 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 60-64 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 65-69 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 70-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 50-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 87 | 78 | 99 | 86 | 89 | 67 | 118 |
| | 55-59 ans | 81 | 84 | 77 | 98 | 93 | 79 | 74 |
| | 60-64 ans | 68 | 71 | 65 | 88 | 51 | 64 | 68 |
| | 65-69 ans | 76 | 61 | 88 | 83 | 115 | 58 | 85 |
| | 70-74 ans | 72 | 75 | 69 | 81 | 95 | 75 | 65 |
| | 50-74 ans | 76 | 74 | 78 | 88 | 85 | 69 | 76 |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 66 (39-107.5) | 66 (41-100) | 67 (37-122) | 73 (49-101) | 67 (37-112) | 57 (37-76) | 69 (37-146) |
| | 55-59 ans | 62 (41-100) | 72 (49-103) | 55.5 (35-85.5) | 93 (64-126.5) | 75 (59-81.5) | 66 (41-103) | 43.5 (33-88) |
| | 60-64 ans | 56 (41-78) | 58.5 (39-83) | 55 (41-71) | 75 (38.5-89) | 57 (34-63) | 53.5 (41-75) | 54.5 (42-75) |
| | 65-69 ans | 50.5 (35-81) | 49.5 (29.5-76) | 52 (38.5-82.5) | 49 (35-140) | 80 (50-85) | 50 (29-76) | 51 (38-82) |
| | 70-74 ans | 52 (35-79) | 62 (41-84) | 48 (33.5-70) | 52 (49-127) | 43 (26-227) | 62.5 (41-83) | 49 (35-70) |
| | 50-74 ans | 57 (37-84) | 62 (39-90) | 54 (36-82) | 76.5 (49-108.5) | 63 (38-85) | 57 (36-80) | 51.5 (36-79) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 4,1 | 5,5 | 2,4 | 6,1 | 3,6 | 4,5 | 0 |
| | 55-59 ans | 6,1 | 6,3 | 5,9 | 14,3 | 11,1 | 2,9 | 4,8 |
| | 60-64 ans | 3,7 | 2,6 | 5 | 0 | 8,3 | 3,6 | 4,2 |
| | 65-69 ans | 2,1 | 2,4 | 1,9 | 14,3 | 0 | 0 | 2,1 |
| | 70-74 ans | 6,8 | 5,4 | 8,2 | 0 | 12,5 | 5,9 | 7,5 |
| | 50-74 ans | 4,6 | 4,3 | 4,9 | 6,3 | 6,5 | 3,5 | 4,4 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 98,9 | 100 | 97,9 | 100 | 87,5 | 100 | 100 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 99,2 | 98,6 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 99,1 | 100 | 98,2 | 100 | 85,7 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,4 | 99,6 | 99,2 | 100 | 96,6 | 99,5 | 100 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 54,3 | 47,1 | 63,4 | 53,3 | 66,7 | 38,1 | 57,1 |
| | 55-59 ans | 52,7 | 44,4 | 60,4 | 25 | 37,5 | 51,5 | 65 |
| | 60-64 ans | 45,2 | 40,8 | 50,9 | 25 | 54,5 | 47,1 | 50 |
| | 65-69 ans | 42,4 | 27,5 | 53,8 | 20 | 80 | 28,6 | 51,1 |
| | 70-74 ans | 42,6 | 30,8 | 53,6 | 0 | 57,1 | 34 | 53,1 |
| | 50-74 ans | 47,2 | 38,6 | 56 | 34,7 | 60,3 | 40,1 | 54,6 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 4,3 | 3,9 | 4,9 | 3,3 | 7,4 | 4,8 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,2 | 4,4 | 0 | 8,3 | 0 | 3 | 0 |
| | 60-64 ans | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5 | 9,1 | 5,9 | 4,5 |
| | 65-69 ans | 3,3 | 5 | 1,9 | 0 | 0 | 5,7 | 2,1 |
| | 70-74 ans | 3,7 | 1,9 | 5,4 | 0 | 0 | 2,1 | 6,1 |
| | 50-74 ans | 3,9 | 4,2 | 3,6 | 4,2 | 5,2 | 4,3 | 3,1 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 2,2 | 2 | 2,4 | 3,3 | 3,7 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,1 | 0 | 2,1 | 0 | 12,5 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1,1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,9 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 1 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 3,4 | 0,5 | 0,5 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 3,7 | 9,5 | 21,4 |
| | 55-59 ans | 9,7 | 6,7 | 12,5 | 8,3 | 12,5 | 6,1 | 12,5 |
| | 60-64 ans | 11,1 | 11,3 | 10,9 | 15 | 9,1 | 9,8 | 11,4 |
| | 65-69 ans | 13 | 10 | 15,4 | 20 | 20 | 8,6 | 14,9 |
| | 70-74 ans | 15,7 | 17,3 | 14,3 | 40 | 14,3 | 14,9 | 14,3 |
| | 50-74 ans | 11,9 | 11,2 | 12,7 | 13,9 | 8,6 | 10,2 | 13,9 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 20,7 | 23,5 | 17,1 | 20 | 18,5 | 28,6 | 14,3 |
| | 55-59 ans | 22,6 | 31,1 | 14,6 | 41,7 | 12,5 | 27,3 | 15 |
| | 60-64 ans | 21,4 | 21,1 | 21,8 | 30 | 9,1 | 17,6 | 25 |
| | 65-69 ans | 23,9 | 32,5 | 17,3 | 0 | 0 | 37,1 | 19,1 |
| | 70-74 ans | 21,3 | 26,9 | 16,1 | 40 | 14,3 | 25,5 | 16,3 |
| | 50-74 ans | 21,9 | 26,3 | 17,5 | 26,4 | 13,8 | 26,2 | 18,6 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 5,4 | 7,8 | 2,4 | 6,7 | 0 | 9,5 | 7,1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 6,5 | 8,9 | 4,2 | 16,7 | 0 | 6,1 | 5 |
| | 60-64 ans | 12,7 | 15,5 | 9,1 | 25 | 18,2 | 11,8 | 6,8 |
| | 65-69 ans | 14,1 | 22,5 | 7,7 | 60 | 0 | 17,1 | 8,5 |
| | 70-74 ans | 11,1 | 19,2 | 3,6 | 20 | 0 | 19,1 | 4,1 |
| | 50-74 ans | 10,2 | 14,7 | 5,6 | 18,1 | 3,4 | 13,4 | 6,2 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 0 | 12,5 | 3 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,8 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0 | 1,7 | 1,1 | 0 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 3,3 | 5,9 | 0 | 3,3 | 0 | 9,5 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,1 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| | 60-64 ans | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 0 | 0 | 3,9 | 2,3 |
| | 65-69 ans | 2,2 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
| | 70-74 ans | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 0 | 0 | 2,1 | 2 |
| | 50-74 ans | 2,2 | 2,3 | 2 | 1,4 | 0 | 2,7 | 2,6 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,1 | 0 | 2,1 | 0 | 12,5 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,2 | 0 | 0,4 | 0 | 1,7 | 0 | 0 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 6,1 | 7,9 | 4,5 | 7,4 | 4,5 | 8,6 | 4,4 |
| | 55-59 ans | 6,8 | 8,8 | 5,3 | 16,7 | 4,9 | 7 | 5,4 |
| | 60-64 ans | 7,1 | 9 | 5,6 | 19,2 | 3,8 | 6,7 | 6 |
| | 65-69 ans | 7,9 | 8,5 | 7,4 | 3,7 | 3,2 | 9,3 | 8,1 |
| | 70-74 ans | 10,7 | 14 | 8,1 | 20,4 | 8,5 | 13,1 | 8 |
| | 50-74 ans | 7,6 | 9,4 | 6,1 | 11,5 | 4,6 | 8,8 | 6,5 |
| | 50-74 ans ** | 7,5 | 9,3 | 5,9 | . | . | . | . |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 4,1 | 5,6 | 2,8 | 4,9 | 3,8 | 6,5 | 1,8 |
| | 55-59 ans | 4,8 | 7,3 | 2,8 | 13,9 | 2,4 | 5,7 | 2,9 |
| | 60-64 ans | 4,7 | 5,8 | 3,8 | 12,8 | 1,9 | 4,3 | 4,1 |
| | 65-69 ans | 5,1 | 6,5 | 3,9 | 0 | 0 | 7,5 | 4,5 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 6,1 | 8,5 | 4,3 | 10,2 | 4,2 | 8,3 | 4,3 |
| | 50-74 ans | 4,9 | 6,6 | 3,5 | 7,6 | 2,8 | 6,3 | 3,7 |
| | 50-74 ans ** | 4,9 | 6,6 | 3,4 | . | . | . | . |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,9 | 5,1 | 2,8 | 4,9 | 3,8 | 5,4 | 1,8 |
| | 55-59 ans | 3,6 | 6,2 | 1,6 | 8,4 | 2,4 | 5,7 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 4 | 4,7 | 3,4 | 8,5 | 1,9 | 3,8 | 3,7 |
| | 65-69 ans | 4,9 | 6 | 3,9 | 0 | 0 | 7 | 4,5 |
| | 70-74 ans | 5,6 | 7,3 | 4,3 | 5,1 | 4,2 | 7,6 | 4,3 |
| | 50-74 ans | 4,3 | 5,7 | 3,2 | 5,6 | 2,8 | 5,8 | 3,3 |
| | 50-74 ans ** | 4,3 | 5,7 | 3,1 | . | . | . | . |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,9 | 5,1 | 2,8 | 4,9 | 3,8 | 5,4 | 1,8 |
| | 55-59 ans | 4,6 | 6,7 | 2,8 | 11,1 | 2,4 | 5,7 | 2,9 |
| | 60-64 ans | 4,3 | 5,5 | 3,4 | 8,5 | 1,9 | 4,8 | 3,7 |
| | 65-69 ans | 5,4 | 6,5 | 4,4 | 3,7 | 0 | 7 | 5,1 |
| | 70-74 ans | 6,1 | 8,5 | 4,3 | 5,1 | 4,2 | 9 | 4,3 |
| | 50-74 ans | 4,8 | 6,3 | 3,5 | 6,4 | 2,8 | 6,3 | 3,7 |
| | 50-74 ans ** | 4,8 | 6,3 | 3,4 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,1 | 1,9 | 0,4 | 1,6 | 0 | 2,2 | 0,9 |
| | 55-59 ans | 1,4 | 2,1 | 0,8 | 5,6 | 0 | 1,3 | 1 |
| | 60-64 ans | 2,8 | 4,3 | 1,6 | 10,7 | 3,8 | 2,9 | 1,1 |
| | 65-69 ans | 3 | 4,5 | 1,7 | 11 | 0 | 3,5 | 2 |
| | 70-74 ans | 3,2 | 6,1 | 0,9 | 5,1 | 0 | 6,2 | 1,1 |
| | 50-74 ans | 2,3 | 3,7 | 1,1 | 5,2 | 0,7 | 3,2 | 1,2 |
| | 50-74 ans ** | 4,8 | 3,4 | 1 | . | . | . | . |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009