Tableau 4-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial§		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	27	14	13	8	11	6	2
	55-59 ans	28	19	9	10	2		7
	60-64 ans	49	33	16	8	2	25	14
	65-69 ans	47	26	21	7	4	19	17
	70-74 ans	56	34	22	6	2	28	20
	50-74 ans	207	126	81	39	21	87	60
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
7.61 Nombre de percentiles presentant un adenesaremente de stade internit	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	11	8	3	3	1	5	2
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade					-			
inconnus exclus)	50-54 ans	27	14	13	8	11	6	2
,	55-59 ans	26	17	9	8	2	9	7
	60-64 ans	46	31	15	7	2		13
	65-69 ans	44	24	20	7	3	17	17
	70-74 ans	53	32	21	6	2		19
	50-74 ans	196	118	78	36	20	82	58
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	21	11	10	7	8	4	2
	55-59 ans	18	13	5	7	0	6	5
	60-64 ans	31	19	12	4	1	15	11
	65-69 ans	31	17	14	5	3	12	11
	70-74 ans	43	25	18	5	2	20	16
	50-74 ans	144	85	59	28	14	57	45
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	3	3	1	3	2	0
	55-59 ans	8	4	4	1	2	3	2
	60-64 ans	15	12	3	3	1	9	2
	65-69 ans	13	7	6	2	0	5	6
	70-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
	50-74 ans	52	33	19	8	6	25	13
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	10	3	7	2	6	1	1
	55-59 ans	7	7	0	4	0	3	0
	60-64 ans	14	8	6	1	1	7	5

Tableau 4-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial§		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	12	5	7	0	2	5	5
	70-74 ans	25	14	11	1	1	13	10
	50-74 ans	68	37	31	8	10	29	21
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	9	6	3	2	0	4	3
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	29	20	9	8	0	12	9
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0
	55-59 ans	5	2	3	2	0	0	3
	60-64 ans	6	4	2	2	0	2	2
	65-69 ans	8	4	4	2	1	2	3
	70-74 ans	11	6	5	2	1	4	4
	50-74 ans	36	20	16	10	4	10	12
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	11	8	3	2	0	6	3

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 4-B: Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM)								
inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7,1	10,5	0	20	0	0	0
	60-64 ans	6,1	6,1	6,3	12,5	0	4	7,1
	65-69 ans	6,4	7,7	4,8	0	25	10,5	0
	70-74 ans	5,4	5,9	4,5	0	0	7,1	5
	50-74 ans	5,3	6,3	3,7	7,7	4,8	5,7	3,3
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes								
ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	22,2	21,4	23,1	12,5	27,3	33,3	0
	55-59 ans	30,8	23,5	44,4	12,5	100	33,3	28,6
	60-64 ans	32,6	38,7	20	42,9	50	37,5	15,4
	65-69 ans	29,5	29,2	30	28,6	0	29,4	35,3
	70-74 ans	18,9	21,9	14,3	16,7	0	23,1	15,8
	50-74 ans	26,5	28	24,4	22,2	30	30,5	22,4
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les	50 54	77.0	70.0	70.0	07.5	70.7	00.7	400
personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	77,8	78,6	76,9	87,5	72,7	66,7	100
	55-59 ans	69,2	76,5	55,6	87,5	0	66,7	71,4
	60-64 ans	67,4	61,3	80	57,1	50	62,5	84,6
	65-69 ans	70,5	70,8	70	71,4	100	70,6	64,7
	70-74 ans	81,1	78,1	85,7	83,3	100	76,9	84,2
FOA Deurscartege de paracanae précentent un concer du câlen de ctode (TNM) 4 normilles	50-74 ans	73,5	72	75,6	77,8	70	69,5	77,6
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	47,6	27,3	70	28,6	75	25	50
	55-59 ans	38,9	53,8	0	57,1	0	50	0
	60-64 ans	45,2	42,1	50	25	100	46,7	45,5
	65-69 ans	38,7	29,4	50	0	66,7	41,7	45,5
	70-74 ans	58,1	56	61,1	20	50	65	62,5
	50-74 ans	47,2	43,5	52,5	28,6	71,4	50,9	46,7
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les	50-74 ans	41,2	43,5	52,5	20,0	71,4	50,9	40,1
personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	19	36,4	0	42,9	0	25	0
,	55-59 ans	22,2	23,1	20	14,3	0	33,3	20
	60-64 ans	19,4	15,8	25	25	0	13,3	27,3

Tableau 4-B: Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	29	35,3	21,4	40	0	33,3	27,3
	70-74 ans	14	16	11,1	20	0	15	12,5
	50-74 ans	20,1	23,5	15,3	28,6	0	21,1	20
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les		· ·						
personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	28,6	36,4	20	28,6	25	50	0
	55-59 ans	27,8	15,4	60	28,6	0	0	60
	60-64 ans	19,4	21,1	16,7	50	0	13,3	18,2
	65-69 ans	25,8	23,5	28,6	40	33,3	16,7	27,3
	70-74 ans	25,6	24	27,8	40	50	20	25
	50-74 ans	25	23,5	27,1	35,7	28,6	17,5	26,7
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les				,	,	,	,	•
personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	4,8	0	10	0	0	0	50
	55-59 ans	11,1	7,7	20	0	0	16,7	20
	60-64 ans	16,1	21,1	8,3	0	0	26,7	9,1
	65-69 ans	6,5	11,8	0	20	0	8,3	0
	70-74 ans	2,3	4	0	20	0	0	0
	50-74 ans	7,6		5,1	7,1	0	10,5	6,7

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire