

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012 †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	10	8	2	5	2	3	0
	55-59 ans	28	13	15	4	4	9	11
	60-64 ans	27	20	7	4	2	16	5
	65-69 ans	37	23	14	5	4	18	10
	70-74 ans	35	23	12	8	4	15	8
	50-74 ans	137	87	50	26	16	61	34
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	14	8	6	3	2	5	4
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	7	2	4	2	3	0
	55-59 ans	26	13	13	4	4	9	9
	60-64 ans	21	16	5	3	2	13	3
	65-69 ans	35	22	13	5	3	17	10
	70-74 ans	32	21	11	7	3	14	8
	50-74 ans	123	79	44	23	14	56	30
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	6	5	1	4	1	1	0
	55-59 ans	23	10	13	3	4	7	9
	60-64 ans	19	14	5	3	2	11	3
	65-69 ans	24	13	11	4	3	9	8
	70-74 ans	25	17	8	6	3	11	5
	50-74 ans	97	59	38	20	13	39	25
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	11	9	2	1	0	8	2
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	50-74 ans	26	20	6	3	1	17	5
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	12	4	8	0	4	4	4
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012 †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	7	5	2	2	0	3	2
	70-74 ans	7	5	2	0	1	5	1
	50-74 ans	36	21	15	5	6	16	9
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	11	5	6	1	1	4	5
	70-74 ans	7	4	3	2	2	2	1
	50-74 ans	27	14	13	5	4	9	9
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
	65-69 ans	3	0	3	0	2	0	1
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	50-74 ans	18	12	6	6	2	6	4
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	1	3	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
	50-74 ans	16	12	4	4	1	8	3

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

[‡] Pour les départements (Côte-d'Or, Nièvre) ayant au plus 30% de données manquantes sur le stade des cancers

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012[‡]. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	10	12,5	0	20	0	0	0
	55-59 ans	7,1	0	13,3	0	0	0	18,2
	60-64 ans	22,2	20	28,6	25	0	18,8	40
	65-69 ans	5,4	4,3	7,1	0	25	5,6	0
	70-74 ans	8,6	8,7	8,3	12,5	25	6,7	0
	50-74 ans	10,2	9,2	12	11,5	12,5	8,2	11,8
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	33,3	28,6	50	0	50	66,7	0
	55-59 ans	11,5	23,1	0	25	0	22,2	0
	60-64 ans	9,5	12,5	0	0	0	15,4	0
	65-69 ans	31,4	40,9	15,4	20	0	47,1	20
	70-74 ans	21,9	19	27,3	14,3	0	21,4	37,5
	50-74 ans	21,1	25,3	13,6	13	7,1	30,4	16,7
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	66,7	71,4	50	100	50	33,3	0
	55-59 ans	88,5	76,9	100	75	100	77,8	100
	60-64 ans	90,5	87,5	100	100	100	84,6	100
	65-69 ans	68,6	59,1	84,6	80	100	52,9	80
	70-74 ans	78,1	81	72,7	85,7	100	78,6	62,5
	50-74 ans	78,9	74,7	86,4	87	92,9	69,6	83,3
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	66,7	60	100	75	100	0	0
	55-59 ans	52,2	40	61,5	0	100	57,1	44,4
	60-64 ans	31,6	28,6	40	0	0	36,4	66,7
	65-69 ans	29,2	38,5	18,2	50	0	33,3	25
	70-74 ans	28	29,4	25	0	33,3	45,5	20
	50-74 ans	37,1	35,6	39,5	25	46,2	41	36
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	17,4	20	15,4	33,3	0	14,3	22,2
	60-64 ans	26,3	21,4	40	33,3	50	18,2	33,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012 †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	45,8	38,5	54,5	25	33,3	44,4	62,5
	70-74 ans	28	23,5	37,5	33,3	66,7	18,2	20
	50-74 ans	27,8	23,7	34,2	25	30,8	23,1	36
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	16,7	20	0	25	0	0	0
	55-59 ans	26,1	30	23,1	33,3	0	28,6	33,3
	60-64 ans	21,1	28,6	0	66,7	0	18,2	0
	65-69 ans	12,5	0	27,3	0	66,7	0	12,5
	70-74 ans	16	23,5	0	33,3	0	18,2	0
	50-74 ans	18,6	20,3	15,8	30	15,4	15,4	16
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	16,7	20	0	0	0	100	0
	55-59 ans	4,3	10	0	33,3	0	0	0
	60-64 ans	21,1	21,4	20	0	50	27,3	0
	65-69 ans	12,5	23,1	0	25	0	22,2	0
	70-74 ans	28	23,5	37,5	33,3	0	18,2	60
	50-74 ans	16,5	20,3	10,5	20	7,7	20,5	12

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

[‡] Pour les départements (Côte-d'Or, Nièvre) ayant au plus 30% de données manquantes sur le stade des cancers

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire