

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11 142	4 576	6 566	3 588	5 153	988	1 413
	55-59 ans	9 794	4 220	5 574	1 875	2 181	2 345	3 393
	60-64 ans	8 150	3 660	4 490	1 332	1 497	2 328	2 993
	65-69 ans	5 408	2 439	2 969	841	967	1 598	2 002
	70-74 ans	3 356	1 495	1 861	480	600	1 015	1 261
	50-74 ans	37 850	16 390	21 460	8 116	10 398	8 274	11 062
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 159	518	641	437	547	81	94
	55-59 ans	1 048	481	567	267	270	214	297
	60-64 ans	845	408	437	193	194	215	243
	65-69 ans	672	296	376	112	163	184	213
	70-74 ans	535	226	309	93	133	133	176
	50-74 ans	4 259	1 929	2 330	1 102	1 307	827	1 023
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	634	260	374	204	299	56	75
	55-59 ans	668	296	372	145	145	151	227
	60-64 ans	520	244	276	97	101	147	175
	65-69 ans	403	183	220	58	83	125	137
	70-74 ans	270	106	164	33	56	73	108
	50-74 ans	2 495	1 089	1 406	537	684	552	722
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	525	258	267	233	248	25	19
	55-59 ans	380	185	195	122	125	63	70
	60-64 ans	325	164	161	96	93	68	68
	65-69 ans	269	113	156	54	80	59	76
	70-74 ans	265	120	145	60	77	60	68
	50-74 ans	1 764	840	924	565	623	275	301
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10 617	4 318	6 299	3 355	4 905	963	1 394
	55-59 ans	9 414	4 035	5 379	1 753	2 056	2 282	3 323
	60-64 ans	7 825	3 496	4 329	1 236	1 404	2 260	2 925
	65-69 ans	5 139	2 326	2 813	787	887	1 539	1 926
	70-74 ans	3 091	1 375	1 716	420	523	955	1 193
	50-74 ans	36 086	15 550	20 536	7 551	9 775	7 999	10 761
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	238	122	116	105	91	17	25
	55-59 ans	245	111	134	52	56	59	78

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	178	93	85	40	37	53	48
	65-69 ans	143	83	60	33	23	50	37
	70-74 ans	84	44	40	13	11	31	29
	50-74 ans	888	453	435	243	218	210	217
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	238	122	116	105	91	17	25
	55-59 ans	244	111	133	52	56	59	77
	60-64 ans	177	92	85	40	37	52	48
	65-69 ans	141	82	59	33	23	49	36
	70-74 ans	84	44	40	13	11	31	29
	50-74 ans	884	451	433	243	218	208	215
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	213	107	106	90	85	17	21
	55-59 ans	223	100	123	46	54	54	69
	60-64 ans	160	81	79	36	33	45	46
	65-69 ans	122	74	48	29	17	45	31
	70-74 ans	76	38	38	10	11	28	27
	50-74 ans	794	400	394	211	200	189	194
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	212	106	106	89	85	17	21
	55-59 ans	218	99	119	46	53	53	66
	60-64 ans	158	81	77	36	32	45	45
	65-69 ans	121	74	47	29	17	45	30
	70-74 ans	76	38	38	10	11	28	27
	50-74 ans	785	398	387	210	198	188	189
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	213	107	106	90	85	17	21
	55-59 ans	221	100	121	46	53	54	68
	60-64 ans	158	81	77	36	32	45	45
	65-69 ans	121	74	47	29	17	45	30
	70-74 ans	76	38	38	10	11	28	27
	50-74 ans	789	400	389	211	198	189	191
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	0	5	0	2	0	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,5	99,6	99,5	100,0	100,0	99,0	99,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,5	87,7	91,4	85,7	93,4	100,0	84,0
	55-59 ans	91,4	90,1	92,5	88,5	96,4	91,5	89,6
	60-64 ans	90,4	88,0	92,9	90,0	89,2	86,5	95,8
	65-69 ans	86,5	90,2	81,4	87,9	73,9	91,8	86,1
	70-74 ans	90,5	86,4	95,0	76,9	100,0	90,3	93,1
	50-74 ans	89,8	88,7	91,0	86,8	91,7	90,9	90,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,5	99,1	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	97,8	99,0	96,7	100,0	98,1	98,1	95,7
	60-64 ans	98,8	100,0	97,5	100,0	97,0	100,0	97,8
	65-69 ans	99,2	100,0	97,9	100,0	100,0	100,0	96,8
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	98,9	99,5	98,2	99,5	99,0	99,5	97,4

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)