

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 5038 | 2301 | 2737 | 1318 | 1460 | 983 | 1277 |
| | 55-59 ans | 4710 | 2054 | 2656 | 504 | 587 | 1550 | 2069 |
| | 60-64 ans | 6254 | 2736 | 3518 | 575 | 677 | 2161 | 2841 |
| | 65-69 ans | 4057 | 1893 | 2164 | 319 | 357 | 1574 | 1807 |
| | 70-74 ans | 4102 | 1824 | 2278 | 295 | 348 | 1529 | 1930 |
| | 50-74 ans | 24161 | 10808 | 13353 | 3011 | 3429 | 7797 | 9924 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 238 | 110 | 128 | 69 | 79 | 41 | 49 |
| | 55-59 ans | 276 | 118 | 158 | 36 | 48 | 82 | 110 |
| | 60-64 ans | 315 | 130 | 185 | 35 | 44 | 95 | 141 |
| | 65-69 ans | 268 | 113 | 155 | 26 | 44 | 87 | 111 |
| | 70-74 ans | 303 | 131 | 172 | 33 | 46 | 98 | 126 |
| | 50-74 ans | 1400 | 602 | 798 | 199 | 261 | 403 | 537 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 155 | 72 | 83 | 42 | 49 | 30 | 34 |
| | 55-59 ans | 198 | 81 | 117 | 21 | 32 | 60 | 85 |
| | 60-64 ans | 252 | 104 | 148 | 25 | 28 | 79 | 120 |
| | 65-69 ans | 203 | 86 | 117 | 13 | 29 | 73 | 88 |
| | 70-74 ans | 232 | 103 | 129 | 22 | 30 | 81 | 99 |
| | 50-74 ans | 1040 | 446 | 594 | 123 | 168 | 323 | 426 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 83 | 38 | 45 | 27 | 30 | 11 | 15 |
| | 55-59 ans | 78 | 37 | 41 | 15 | 16 | 22 | 25 |
| | 60-64 ans | 63 | 26 | 37 | 10 | 16 | 16 | 21 |
| | 65-69 ans | 65 | 27 | 38 | 13 | 15 | 14 | 23 |
| | 70-74 ans | 71 | 28 | 43 | 11 | 16 | 17 | 27 |
| | 50-74 ans | 360 | 156 | 204 | 76 | 93 | 80 | 111 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 4955 | 2263 | 2692 | 1291 | 1430 | 972 | 1262 |
| | 55-59 ans | 4632 | 2017 | 2615 | 489 | 571 | 1528 | 2044 |
| | 60-64 ans | 6191 | 2710 | 3481 | 565 | 661 | 2145 | 2820 |
| | 65-69 ans | 3992 | 1866 | 2126 | 306 | 342 | 1560 | 1784 |
| | 70-74 ans | 4031 | 1796 | 2235 | 284 | 332 | 1512 | 1903 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 23801 | 10652 | 13149 | 2935 | 3336 | 7717 | 9813 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 108 | 65 | 43 | 43 | 25 | 22 | 18 |
| | 55-59 ans | 114 | 49 | 65 | 16 | 13 | 33 | 52 |
| | 60-64 ans | 158 | 77 | 81 | 21 | 12 | 56 | 69 |
| | 65-69 ans | 113 | 50 | 63 | 11 | 14 | 39 | 49 |
| | 70-74 ans | 141 | 69 | 72 | 14 | 17 | 55 | 55 |
| | 50-74 ans | 634 | 310 | 324 | 105 | 81 | 205 | 243 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 108 | 65 | 43 | 43 | 25 | 22 | 18 |
| | 55-59 ans | 113 | 49 | 64 | 16 | 13 | 33 | 51 |
| | 60-64 ans | 158 | 77 | 81 | 21 | 12 | 56 | 69 |
| | 65-69 ans | 111 | 49 | 62 | 11 | 13 | 38 | 49 |
| | 70-74 ans | 141 | 69 | 72 | 14 | 17 | 55 | 55 |
| | 50-74 ans | 631 | 309 | 322 | 105 | 80 | 204 | 242 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 97 | 56 | 41 | 35 | 23 | 21 | 18 |
| | 55-59 ans | 106 | 47 | 59 | 15 | 11 | 32 | 48 |
| | 60-64 ans | 149 | 72 | 77 | 21 | 10 | 51 | 67 |
| | 65-69 ans | 105 | 45 | 60 | 8 | 12 | 37 | 48 |
| | 70-74 ans | 128 | 63 | 65 | 12 | 15 | 51 | 50 |
| | 50-74 ans | 585 | 283 | 302 | 91 | 71 | 192 | 231 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 97 | 56 | 41 | 35 | 23 | 21 | 18 |
| | 55-59 ans | 103 | 44 | 59 | 13 | 11 | 31 | 48 |
| | 60-64 ans | 143 | 69 | 74 | 21 | 10 | 48 | 64 |
| | 65-69 ans | 104 | 44 | 60 | 7 | 12 | 37 | 48 |
| | 70-74 ans | 123 | 62 | 61 | 12 | 12 | 50 | 49 |
| | 50-74 ans | 570 | 275 | 295 | 88 | 68 | 187 | 227 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 97 | 56 | 41 | 35 | 23 | 21 | 18 |
| | 55-59 ans | 105 | 46 | 59 | 14 | 11 | 32 | 48 |
| | 60-64 ans | 147 | 71 | 76 | 21 | 10 | 50 | 66 |
| | 65-69 ans | 105 | 45 | 60 | 8 | 12 | 37 | 48 |
| | 70-74 ans | 125 | 63 | 62 | 12 | 12 | 51 | 50 |
| | 50-74 ans | 579 | 281 | 298 | 90 | 68 | 191 | 230 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 97 | 56 | 41 | 35 | 23 | 21 | 18 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 104 | 46 | 58 | 14 | 11 | 32 | 47 |
| | 60-64 ans | 147 | 71 | 76 | 21 | 10 | 50 | 66 |
| | 65-69 ans | 105 | 45 | 60 | 8 | 12 | 37 | 48 |
| | 70-74 ans | 127 | 63 | 64 | 12 | 14 | 51 | 50 |
| | 50-74 ans | 580 | 281 | 299 | 90 | 70 | 191 | 229 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 97 | 56 | 41 | 35 | 23 | 21 | 18 |
| | 55-59 ans | 106 | 47 | 59 | 15 | 11 | 32 | 48 |
| | 60-64 ans | 149 | 72 | 77 | 21 | 10 | 51 | 67 |
| | 65-69 ans | 105 | 45 | 60 | 8 | 12 | 37 | 48 |
| | 70-74 ans | 128 | 63 | 65 | 12 | 15 | 51 | 50 |
| | 50-74 ans | 585 | 283 | 302 | 91 | 71 | 192 | 231 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 50 | 24 | 26 | 14 | 15 | 10 | 11 |
| | 55-59 ans | 58 | 21 | 37 | 7 | 7 | 14 | 30 |
| | 60-64 ans | 76 | 33 | 43 | 7 | 5 | 26 | 38 |
| | 65-69 ans | 49 | 15 | 34 | 2 | 6 | 13 | 28 |
| | 70-74 ans | 53 | 17 | 36 | 2 | 8 | 15 | 28 |
| | 50-74 ans | 286 | 110 | 176 | 32 | 41 | 78 | 135 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| | 65-69 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 70-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 27 | 15 | 12 | 6 | 3 | 9 | 9 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 12 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| | 55-59 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| | 60-64 ans | 25 | 13 | 12 | 3 | 2 | 10 | 10 |
| | 65-69 ans | 17 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| | 70-74 ans | 17 | 13 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 |
| | 50-74 ans | 79 | 43 | 36 | 13 | 8 | 30 | 28 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 17 | 12 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 |
| | 55-59 ans | 16 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| | 60-64 ans | 23 | 14 | 9 | 8 | 0 | 6 | 9 |
| | 65-69 ans | 23 | 14 | 9 | 3 | 2 | 11 | 7 |
| | 70-74 ans | 26 | 14 | 12 | 3 | 2 | 11 | 10 |
| | 50-74 ans | 105 | 62 | 43 | 23 | 9 | 39 | 34 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| | 60-64 ans | 15 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| | 65-69 ans | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| | 70-74 ans | 19 | 13 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| | 50-74 ans | 54 | 36 | 18 | 12 | 5 | 24 | 13 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| | 50-74 ans | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 29 | 19 | 10 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| | 55-59 ans | 24 | 13 | 11 | 2 | 2 | 11 | 9 |
| | 60-64 ans | 48 | 27 | 21 | 11 | 2 | 16 | 19 |
| | 65-69 ans | 40 | 19 | 21 | 4 | 5 | 15 | 16 |
| | 70-74 ans | 43 | 27 | 16 | 5 | 3 | 22 | 13 |
| | 50-74 ans | 184 | 105 | 79 | 36 | 17 | 69 | 62 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 17 | 12 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 |
| | 55-59 ans | 16 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| | 60-64 ans | 23 | 14 | 9 | 8 | 0 | 6 | 9 |
| | 65-69 ans | 23 | 14 | 9 | 3 | 2 | 11 | 7 |
| | 70-74 ans | 26 | 14 | 12 | 3 | 2 | 11 | 10 |
| | 50-74 ans | 105 | 62 | 43 | 23 | 9 | 39 | 34 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 16 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| | 55-59 ans | 13 | 7 | 6 | 0 | 2 | 7 | 4 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 18 | 11 | 7 | 5 | 0 | 6 | 7 |
| | 65-69 ans | 19 | 10 | 9 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| | 70-74 ans | 24 | 13 | 11 | 2 | 1 | 11 | 10 |
| | 50-74 ans | 90 | 52 | 38 | 17 | 8 | 35 | 30 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| | 60-64 ans | 15 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| | 65-69 ans | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| | 70-74 ans | 19 | 13 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| | 50-74 ans | 54 | 36 | 18 | 12 | 5 | 24 | 13 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| | 60-64 ans | 15 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| | 65-69 ans | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| | 70-74 ans | 19 | 13 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| | 50-74 ans | 53 | 35 | 18 | 12 | 5 | 23 | 13 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| | 60-64 ans | 15 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| | 65-69 ans | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| | 70-74 ans | 19 | 13 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| | 50-74 ans | 53 | 35 | 18 | 12 | 5 | 23 | 13 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| | 65-69 ans | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| | 50-74 ans | 37 | 25 | 12 | 8 | 5 | 17 | 7 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| | 60-64 ans | 15 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| | 65-69 ans | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| | 70-74 ans | 19 | 13 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| | 50-74 ans | 53 | 35 | 18 | 12 | 5 | 23 | 13 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 11 | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| | 50-74 ans | 35 | 19 | 16 | 12 | 7 | 7 | 9 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | 4,2 | 3,8 |
| | 55-59 ans | 5,9 | 5,7 | 5,9 | 7,1 | 8,2 | 5,3 | 5,3 |
| | 60-64 ans | 5 | 4,8 | 5,3 | 6,1 | 6,5 | 4,4 | 5 |
| | 65-69 ans | 6,6 | 6 | 7,2 | 8,2 | 12,3 | 5,5 | 6,1 |
| | 70-74 ans | 7,4 | 7,2 | 7,6 | 11,2 | 13,2 | 6,4 | 6,5 |
| | 50-74 ans | 5,8 | 5,6 | 6 | 6,6 | 7,6 | 5,2 | 5,4 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 2 | 2,1 | 1,1 | 1,2 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 3 | 2,7 | 1,4 | 1,2 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 0,7 | 0,7 |
| | 65-69 ans | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 4,1 | 4,2 | 0,9 | 1,3 |
| | 70-74 ans | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 3,7 | 4,6 | 1,1 | 1,4 |
| | 50-74 ans | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 2,7 | 1 | 1,1 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 65,1 | 65,5 | 64,8 | 60,9 | 62 | 73,2 | 69,4 |
| | 55-59 ans | 71,7 | 68,6 | 74,1 | 58,3 | 66,7 | 73,2 | 77,3 |
| | 60-64 ans | 80 | 80 | 80 | 71,4 | 63,6 | 83,2 | 85,1 |
| | 65-69 ans | 75,7 | 76,1 | 75,5 | 50 | 65,9 | 83,9 | 79,3 |
| | 70-74 ans | 76,6 | 78,6 | 75 | 66,7 | 65,2 | 82,7 | 78,6 |
| | 50-74 ans | 74,3 | 74,1 | 74,4 | 61,8 | 64,4 | 80,1 | 79,3 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 2,2 | 2,9 | 1,6 | 3,3 | 1,7 | 2,3 | 1,4 |
| | 55-59 ans | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 |
| | 60-64 ans | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 3,7 | 1,8 | 2,6 | 2,4 |
| | 65-69 ans | 2,8 | 2,7 | 3 | 3,6 | 4,1 | 2,5 | 2,7 |
| | 70-74 ans | 3,5 | 3,8 | 3,2 | 4,9 | 5,1 | 3,6 | 2,9 |
| | 50-74 ans | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 3,6 | 2,4 | 2,7 | 2,5 |
| 50-74 ans ** | 2,6 | 2,9 | 2,4 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 99,1 | 100 | 98,5 | 100 | 100 | 100 | 98,1 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 98,2 | 98 | 98,4 | 100 | 92,9 | 97,4 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,5 | 99,7 | 99,4 | 100 | 98,8 | 99,5 | 99,6 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 89,8 | 86,2 | 95,3 | 81,4 | 92 | 95,5 | 100 |
| | 55-59 ans | 93,8 | 95,9 | 92,2 | 93,8 | 84,6 | 97 | 94,1 |
| | 60-64 ans | 94,3 | 93,5 | 95,1 | 100 | 83,3 | 91,1 | 97,1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 94,6 | 91,8 | 96,8 | 72,7 | 92,3 | 97,4 | 98 |
| | 70-74 ans | 90,8 | 91,3 | 90,3 | 85,7 | 88,2 | 92,7 | 90,9 |
| | 50-74 ans | 92,7 | 91,6 | 93,8 | 86,7 | 88,8 | 94,1 | 95,5 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 97,2 | 93,6 | 100 | 86,7 | 100 | 96,9 | 100 |
| | 60-64 ans | 96 | 95,8 | 96,1 | 100 | 100 | 94,1 | 95,5 |
| | 65-69 ans | 99 | 97,8 | 100 | 87,5 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 96,1 | 98,4 | 93,8 | 100 | 80 | 98 | 98 |
| | 50-74 ans | 97,4 | 97,2 | 97,7 | 96,7 | 95,8 | 97,4 | 98,3 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 55-59 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 60-64 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 65-69 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 70-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 50-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 81 | 85 | 75 | 80 | 81 | 95 | 68 |
| | 55-59 ans | 83 | 82 | 84 | 81 | 139 | 82 | 72 |
| | 60-64 ans | 77 | 86 | 68 | 99 | 46 | 81 | 71 |
| | 65-69 ans | 68 | 65 | 70 | 109 | 55 | 55 | 74 |
| | 70-74 ans | 75 | 74 | 76 | 78 | 87 | 73 | 73 |
| | 50-74 ans | 77 | 79 | 74 | 87 | 82 | 76 | 72 |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 57 (34-100) | 64.5 (36-96.5) | 48 (31-104) | 60 (33-93) | 43 (29-110) | 72 (43-122) | 50.5 (31-98) |
| | 55-59 ans | 61.5 (38-104) | 72 (45-105) | 57 (35-89) | 82 (39-104) | 71 (51-135) | 67 (46.5-105.5) | 45 (34-88) |
| | 60-64 ans | 51 (38-70) | 56.5 (43.5-82) | 45 (34-61) | 68 (45-84) | 42.5 (34-61) | 52 (42-74) | 45 (33-63) |
| | 65-69 ans | 50 (35-75) | 49 (34-74) | 52 (37.5-76.5) | 54.5 (32-174.5) | 42.5 (22-70) | 48 (34-74) | 53 (40-76.5) |
| | 70-74 ans | 50.5 (34-81) | 55 (34-83) | 49 (34-72) | 42 (25.5-138) | 48 (33-119) | 57 (38-81) | 49 (35-72) |
| | 50-74 ans | 52 (36-83) | 57 (38-92) | 49 (34-78) | 66 (35-104) | 49 (34-92) | 55 (41-84) | 49 (34-71) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 10,2 | 13,8 | 4,7 | 18,6 | 8 | 4,5 | 0 |
| | 55-59 ans | 5,3 | 2 | 7,7 | 6,3 | 15,4 | 0 | 5,8 |
| | 60-64 ans | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 0 | 16,7 | 5,4 | 1,4 |
| | 65-69 ans | 4,4 | 6 | 3,2 | 18,2 | 7,1 | 2,6 | 2 |
| | 70-74 ans | 5 | 4,3 | 5,6 | 7,1 | 0 | 3,6 | 7,3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 5,5 | 6,1 | 4,9 | 11,4 | 8,6 | 3,4 | 3,7 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 98,1 | 97,9 | 98,3 | 93,3 | 100 | 100 | 97,9 |
| | 60-64 ans | 98,7 | 98,6 | 98,7 | 100 | 100 | 98 | 98,5 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 99,2 | 100 | 98,5 | 100 | 93,3 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,1 | 99,3 | 99 | 98,9 | 98,6 | 99,5 | 99,1 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 51,5 | 42,9 | 63,4 | 40 | 65,2 | 47,6 | 61,1 |
| | 55-59 ans | 54,7 | 44,7 | 62,7 | 46,7 | 63,6 | 43,8 | 62,5 |
| | 60-64 ans | 51 | 45,8 | 55,8 | 33,3 | 50 | 51 | 56,7 |
| | 65-69 ans | 46,7 | 33,3 | 56,7 | 25 | 50 | 35,1 | 58,3 |
| | 70-74 ans | 41,4 | 27 | 55,4 | 16,7 | 53,3 | 29,4 | 56 |
| | 50-74 ans | 48,9 | 38,9 | 58,3 | 35,2 | 57,7 | 40,6 | 58,4 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 5,7 | 8,7 | 9,5 | 5,6 |
| | 55-59 ans | 5,7 | 8,5 | 3,4 | 13,3 | 0 | 6,3 | 4,2 |
| | 60-64 ans | 4,7 | 4,2 | 5,2 | 9,5 | 0 | 2 | 6 |
| | 65-69 ans | 3,8 | 6,7 | 1,7 | 0 | 0 | 8,1 | 2,1 |
| | 70-74 ans | 2,3 | 1,6 | 3,1 | 0 | 6,7 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 4,6 | 5,3 | 4 | 6,6 | 4,2 | 4,7 | 3,9 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 3,1 | 1,8 | 4,9 | 2,9 | 4,3 | 0 | 5,6 |
| | 55-59 ans | 0,9 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1,9 | 2,2 | 1,7 | 0 | 0 | 2,7 | 2,1 |
| | 70-74 ans | 2,3 | 1,6 | 3,1 | 0 | 6,7 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 1,5 | 1,1 | 2 | 1,1 | 2,8 | 1 | 1,7 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 12,4 | 12,5 | 12,2 | 17,1 | 8,7 | 4,8 | 16,7 |
| | 55-59 ans | 7,5 | 10,6 | 5,1 | 6,7 | 0 | 12,5 | 6,3 |
| | 60-64 ans | 16,8 | 18,1 | 15,6 | 14,3 | 20 | 19,6 | 14,9 |
| | 65-69 ans | 16,2 | 11,1 | 20 | 12,5 | 25 | 10,8 | 18,8 |
| | 70-74 ans | 13,3 | 20,6 | 6,2 | 16,7 | 6,7 | 21,6 | 6 |
| | 50-74 ans | 13,5 | 15,2 | 11,9 | 14,3 | 11,3 | 15,6 | 12,1 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 17,5 | 21,4 | 12,2 | 22,9 | 13 | 19 | 11,1 |
| | 55-59 ans | 15,1 | 17 | 13,6 | 6,7 | 18,2 | 21,9 | 12,5 |
| | 60-64 ans | 15,4 | 19,4 | 11,7 | 38,1 | 0 | 11,8 | 13,4 |
| | 65-69 ans | 21,9 | 31,1 | 15 | 37,5 | 16,7 | 29,7 | 14,6 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 20,3 | 22,2 | 18,5 | 25 | 13,3 | 21,6 | 20 |
| | 50-74 ans | 17,9 | 21,9 | 14,2 | 25,3 | 12,7 | 20,3 | 14,7 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 4,1 | 7,1 | 0 | 5,7 | 0 | 9,5 | 0 |
| | 55-59 ans | 8,5 | 12,8 | 5,1 | 13,3 | 9,1 | 12,5 | 4,2 |
| | 60-64 ans | 10,1 | 9,7 | 10,4 | 4,8 | 30 | 11,8 | 7,5 |
| | 65-69 ans | 6,7 | 13,3 | 1,7 | 25 | 0 | 10,8 | 2,1 |
| | 70-74 ans | 14,8 | 20,6 | 9,2 | 41,7 | 6,7 | 15,7 | 10 |
| | 50-74 ans | 9,2 | 12,7 | 6 | 13,2 | 7 | 12,5 | 5,6 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,9 | 0 | 3,4 | 0 | 9,1 | 0 | 2,1 |
| | 60-64 ans | 0,7 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1,7 | 0 | 8,3 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,7 | 0,4 | 1 | 0 | 2,8 | 0,5 | 0,4 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 3,1 | 5,4 | 0 | 2,9 | 0 | 9,5 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,9 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
| | 60-64 ans | 0,7 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
| | 70-74 ans | 3,9 | 6,3 | 1,5 | 0 | 0 | 7,8 | 2 |
| | 50-74 ans | 1,9 | 2,8 | 1 | 1,1 | 0 | 3,6 | 1,3 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 6,7 | 0 | 0 | 2,1 |
| | 60-64 ans | 0,7 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 0 | 0 | 0,9 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 5,9 | 8,4 | 3,7 | 10,8 | 3,5 | 5,1 | 4 |
| | 55-59 ans | 5,2 | 6,4 | 4,2 | 4,1 | 3,5 | 7,2 | 4,4 |
| | 60-64 ans | 7,8 | 10 | 6 | 19,5 | 3 | 7,5 | 6,7 |
| | 65-69 ans | 10 | 10,2 | 9,9 | 13,1 | 14,6 | 9,6 | 9 |
| | 70-74 ans | 10,7 | 15 | 7,2 | 17,6 | 9 | 14,6 | 6,8 |
| | 50-74 ans | 7,7 | 9,9 | 6 | 12,3 | 5,1 | 8,9 | 6,3 |
| | 50-74 ans ** | 7,5 | 9,4 | 5,8 | . | . | . | . |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,4 | 5,3 | 1,9 | 6,2 | 2,1 | 4,1 | 1,6 |
| | 55-59 ans | 3,5 | 4 | 3,1 | 2 | 3,5 | 4,6 | 2,9 |
| | 60-64 ans | 3,7 | 5,2 | 2,6 | 14,2 | 0 | 2,8 | 3,2 |
| | 65-69 ans | 5,8 | 7,5 | 4,2 | 9,8 | 5,8 | 7,1 | 3,9 |
| | 70-74 ans | 6,5 | 7,8 | 5,4 | 10,6 | 6 | 7,3 | 5,3 |
| | 50-74 ans | 4,4 | 5,8 | 3,3 | 7,8 | 2,7 | 5,1 | 3,5 |
| | 50-74 ans ** | 4,3 | 5,6 | 3,2 | . | . | . | . |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,2 | 4,9 | 1,9 | 6,2 | 2,1 | 3,1 | 1,6 |
| | 55-59 ans | 2,8 | 3,5 | 2,3 | 0 | 3,5 | 4,6 | 2 |
| | 60-64 ans | 2,9 | 4,1 | 2 | 8,8 | 0 | 2,8 | 2,5 |
| | 65-69 ans | 4,8 | 5,4 | 4,2 | 6,5 | 5,8 | 5,1 | 3,9 |
| | 70-74 ans | 6 | 7,2 | 4,9 | 7 | 3 | 7,3 | 5,3 |
| | 50-74 ans | 3,8 | 4,9 | 2,9 | 5,8 | 2,4 | 4,5 | 3,1 |
| | 50-74 ans ** | 3,7 | 4,7 | 2,8 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 1,8 | 0 | 1,5 | 0 | 2,1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,9 | 3 | 1,1 | 4,1 | 1,8 | 2,6 | 1 |
| | 60-64 ans | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 1,8 | 4,5 | 2,8 | 1,8 |
| | 65-69 ans | 1,8 | 3,2 | 0,5 | 6,5 | 0 | 2,6 | 0,6 |
| | 70-74 ans | 4,7 | 7,2 | 2,7 | 17,6 | 3 | 5,3 | 2,6 |
| | 50-74 ans | 2,3 | 3,4 | 1,4 | 4,1 | 1,5 | 3,1 | 1,3 |
| | 50-74 ans ** | 2,2 | 3,2 | 1,2 | . | . | . | . |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009