

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 5155 | 2341 | 2814 | 1758 | 2027 | 583 | 787 |
| | 55-59 ans | 4700 | 2061 | 2639 | 1066 | 1349 | 995 | 1290 |
| | 60-64 ans | 6141 | 2687 | 3454 | 1209 | 1511 | 1478 | 1943 |
| | 65-69 ans | 3791 | 1771 | 2020 | 743 | 801 | 1028 | 1219 |
| | 70-74 ans | 4342 | 1902 | 2440 | 783 | 1064 | 1119 | 1376 |
| | 50-74 ans | 24129 | 10762 | 13367 | 5559 | 6752 | 5203 | 6615 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 252 | 105 | 147 | 78 | 114 | 27 | 33 |
| | 55-59 ans | 248 | 100 | 148 | 42 | 82 | 58 | 66 |
| | 60-64 ans | 329 | 137 | 192 | 67 | 77 | 70 | 115 |
| | 65-69 ans | 247 | 110 | 137 | 52 | 63 | 58 | 74 |
| | 70-74 ans | 316 | 145 | 171 | 66 | 85 | 79 | 86 |
| | 50-74 ans | 1392 | 597 | 795 | 305 | 421 | 292 | 374 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 145 | 56 | 89 | 39 | 65 | 17 | 24 |
| | 55-59 ans | 174 | 71 | 103 | 28 | 55 | 43 | 48 |
| | 60-64 ans | 236 | 95 | 141 | 43 | 50 | 52 | 91 |
| | 65-69 ans | 180 | 79 | 101 | 31 | 39 | 48 | 62 |
| | 70-74 ans | 229 | 106 | 123 | 43 | 54 | 63 | 69 |
| | 50-74 ans | 964 | 407 | 557 | 184 | 263 | 223 | 294 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 107 | 49 | 58 | 39 | 49 | 10 | 9 |
| | 55-59 ans | 74 | 29 | 45 | 14 | 27 | 15 | 18 |
| | 60-64 ans | 93 | 42 | 51 | 24 | 27 | 18 | 24 |
| | 65-69 ans | 67 | 31 | 36 | 21 | 24 | 10 | 12 |
| | 70-74 ans | 87 | 39 | 48 | 23 | 31 | 16 | 17 |
| | 50-74 ans | 428 | 190 | 238 | 121 | 158 | 69 | 80 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 5048 | 2292 | 2756 | 1719 | 1978 | 573 | 778 |
| | 55-59 ans | 4626 | 2032 | 2594 | 1052 | 1322 | 980 | 1272 |
| | 60-64 ans | 6048 | 2645 | 3403 | 1185 | 1484 | 1460 | 1919 |
| | 65-69 ans | 3724 | 1740 | 1984 | 722 | 777 | 1018 | 1207 |
| | 70-74 ans | 4255 | 1863 | 2392 | 760 | 1033 | 1103 | 1359 |
| | 50-74 ans | 23701 | 10572 | 13129 | 5438 | 6594 | 5134 | 6535 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 131 | 63 | 68 | 53 | 51 | 10 | 17 |
| | 55-59 ans | 125 | 62 | 63 | 38 | 30 | 24 | 33 |
| | 60-64 ans | 181 | 79 | 102 | 45 | 44 | 34 | 58 |
| | 65-69 ans | 123 | 65 | 58 | 31 | 26 | 34 | 32 |
| | 70-74 ans | 169 | 83 | 86 | 42 | 42 | 41 | 44 |
| | 50-74 ans | 729 | 352 | 377 | 209 | 193 | 143 | 184 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 130 | 62 | 68 | 52 | 51 | 10 | 17 |
| | 55-59 ans | 124 | 62 | 62 | 38 | 30 | 24 | 32 |
| | 60-64 ans | 181 | 79 | 102 | 45 | 44 | 34 | 58 |
| | 65-69 ans | 121 | 64 | 57 | 31 | 25 | 33 | 32 |
| | 70-74 ans | 167 | 82 | 85 | 42 | 42 | 40 | 43 |
| | 50-74 ans | 723 | 349 | 374 | 208 | 192 | 141 | 182 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 116 | 53 | 63 | 43 | 47 | 10 | 16 |
| | 55-59 ans | 118 | 60 | 58 | 37 | 28 | 23 | 30 |
| | 60-64 ans | 170 | 74 | 96 | 41 | 40 | 33 | 56 |
| | 65-69 ans | 111 | 55 | 56 | 23 | 24 | 32 | 32 |
| | 70-74 ans | 153 | 76 | 77 | 40 | 37 | 36 | 40 |
| | 50-74 ans | 668 | 318 | 350 | 184 | 176 | 134 | 174 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 114 | 53 | 61 | 43 | 45 | 10 | 16 |
| | 55-59 ans | 118 | 60 | 58 | 37 | 28 | 23 | 30 |
| | 60-64 ans | 166 | 73 | 93 | 41 | 40 | 32 | 53 |
| | 65-69 ans | 110 | 54 | 56 | 23 | 24 | 31 | 32 |
| | 70-74 ans | 147 | 72 | 75 | 37 | 35 | 35 | 40 |
| | 50-74 ans | 655 | 312 | 343 | 181 | 172 | 131 | 171 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 116 | 53 | 63 | 43 | 47 | 10 | 16 |
| | 55-59 ans | 118 | 60 | 58 | 37 | 28 | 23 | 30 |
| | 60-64 ans | 169 | 74 | 95 | 41 | 40 | 33 | 55 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 111 | 55 | 56 | 23 | 24 | 32 | 32 |
| | 70-74 ans | 150 | 75 | 75 | 39 | 35 | 36 | 40 |
| | 50-74 ans | 664 | 317 | 347 | 183 | 174 | 134 | 173 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 115 | 53 | 62 | 43 | 46 | 10 | 16 |
| | 55-59 ans | 118 | 60 | 58 | 37 | 28 | 23 | 30 |
| | 60-64 ans | 168 | 73 | 95 | 41 | 40 | 32 | 55 |
| | 65-69 ans | 110 | 54 | 56 | 23 | 24 | 31 | 32 |
| | 70-74 ans | 153 | 76 | 77 | 40 | 37 | 36 | 40 |
| | 50-74 ans | 664 | 316 | 348 | 184 | 175 | 132 | 173 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 116 | 53 | 63 | 43 | 47 | 10 | 16 |
| | 55-59 ans | 118 | 60 | 58 | 37 | 28 | 23 | 30 |
| | 60-64 ans | 170 | 74 | 96 | 41 | 40 | 33 | 56 |
| | 65-69 ans | 111 | 55 | 56 | 23 | 24 | 32 | 32 |
| | 70-74 ans | 154 | 77 | 77 | 40 | 37 | 37 | 40 |
| | 50-74 ans | 669 | 319 | 350 | 184 | 176 | 135 | 174 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 71 | 29 | 42 | 22 | 31 | 7 | 11 |
| | 55-59 ans | 61 | 27 | 34 | 16 | 17 | 11 | 17 |
| | 60-64 ans | 88 | 30 | 58 | 14 | 24 | 16 | 34 |
| | 65-69 ans | 57 | 26 | 31 | 12 | 13 | 14 | 18 |
| | 70-74 ans | 69 | 25 | 44 | 12 | 22 | 13 | 22 |
| | 50-74 ans | 346 | 137 | 209 | 76 | 107 | 61 | 102 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 42 | 19 | 23 | 12 | 14 | 7 | 9 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 12 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| | 60-64 ans | 28 | 19 | 9 | 10 | 2 | 9 | 7 |
| | 65-69 ans | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| | 70-74 ans | 22 | 15 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 |
| | 50-74 ans | 85 | 55 | 30 | 31 | 12 | 24 | 18 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 15 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 19 | 13 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 |
| | 60-64 ans | 23 | 13 | 10 | 11 | 6 | 2 | 4 |
| | 65-69 ans | 28 | 17 | 11 | 8 | 7 | 9 | 4 |
| | 70-74 ans | 25 | 11 | 14 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| | 50-74 ans | 110 | 62 | 48 | 40 | 27 | 22 | 21 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 14 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 23 | 17 | 6 | 10 | 1 | 7 | 5 |
| | 50-74 ans | 52 | 32 | 20 | 18 | 6 | 14 | 14 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 50-74 ans | 12 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 27 | 15 | 12 | 14 | 9 | 1 | 3 |
| | 55-59 ans | 31 | 22 | 9 | 13 | 3 | 9 | 6 |
| | 60-64 ans | 51 | 32 | 19 | 21 | 8 | 11 | 11 |
| | 65-69 ans | 39 | 22 | 17 | 10 | 9 | 12 | 8 |
| | 70-74 ans | 47 | 26 | 21 | 13 | 10 | 13 | 11 |
| | 50-74 ans | 195 | 117 | 78 | 71 | 39 | 46 | 39 |
| A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté | 50-54 ans | 15 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 19 | 13 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 |
| | 60-64 ans | 23 | 13 | 10 | 11 | 6 | 2 | 4 |
| | 65-69 ans | 28 | 17 | 11 | 8 | 7 | 9 | 4 |
| | 70-74 ans | 25 | 11 | 14 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| | 50-74 ans | 110 | 62 | 48 | 40 | 27 | 22 | 21 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 14 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 23 | 17 | 6 | 10 | 1 | 7 | 5 |
| | 50-74 ans | 52 | 32 | 20 | 18 | 6 | 14 | 14 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 13 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 22 | 16 | 6 | 9 | 1 | 7 | 5 |
| | 50-74 ans | 48 | 28 | 20 | 15 | 6 | 13 | 14 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 13 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 22 | 16 | 6 | 9 | 1 | 7 | 5 |
| | 50-74 ans | 48 | 28 | 20 | 15 | 6 | 13 | 14 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| | 50-74 ans | 31 | 18 | 13 | 7 | 4 | 11 | 9 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 17 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|--------|
| | | | Hommes | Femmes | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| | 50-74 ans | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| | 50-74 ans | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| | 50-74 ans | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | 50-74 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| | 55-59 ans | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| | 60-64 ans | 12 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| | 70-74 ans | 22 | 16 | 6 | 9 | 1 | 7 | 5 | |
| | 50-74 ans | 47 | 28 | 19 | 15 | 6 | 13 | 13 | |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 13 | 9 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
| | 55-59 ans | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| | 60-64 ans | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| | 65-69 ans | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| | 70-74 ans | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| | 50-74 ans | 44 | 24 | 20 | 20 | 13 | 4 | 7 | |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 4,9 | 4,5 | 5,2 | 4,4 | 5,6 | 4,6 | 4,2 |
| | 55-59 ans | 5,3 | 4,9 | 5,6 | 3,9 | 6,1 | 5,8 | 5,1 |
| | 60-64 ans | 5,4 | 5,1 | 5,6 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 5,9 |
| | 65-69 ans | 6,5 | 6,2 | 6,8 | 7 | 7,9 | 5,6 | 6,1 |
| | 70-74 ans | 7,3 | 7,6 | 7 | 8,4 | 8 | 7,1 | 6,3 |
| | 50-74 ans | 5,8 | 5,5 | 5,9 | 5,5 | 6,2 | 5,6 | 5,7 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 1,1 |
| | 55-59 ans | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 2 | 1,5 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 2 | 1,8 | 1,2 | 1,2 |
| | 65-69 ans | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,8 | 3 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 2,1 | 2 | 2,9 | 2,9 | 1,4 | 1,2 |
| | 50-74 ans | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 1,3 | 1,2 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 57,5 | 53,3 | 60,5 | 50 | 57 | 63 | 72,7 |
| | 55-59 ans | 70,2 | 71 | 69,6 | 66,7 | 67,1 | 74,1 | 72,7 |
| | 60-64 ans | 71,7 | 69,3 | 73,4 | 64,2 | 64,9 | 74,3 | 79,1 |
| | 65-69 ans | 72,9 | 71,8 | 73,7 | 59,6 | 61,9 | 82,8 | 83,8 |
| | 70-74 ans | 72,5 | 73,1 | 71,9 | 65,2 | 63,5 | 79,7 | 80,2 |
| | 50-74 ans | 69,3 | 68,2 | 70,1 | 60,3 | 62,5 | 76,4 | 78,6 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 2,6 | 1,7 | 2,2 |
| | 55-59 ans | 2,7 | 3,1 | 2,4 | 3,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 3 | 3,8 | 3 | 2,3 | 3 |
| | 65-69 ans | 3,3 | 3,7 | 2,9 | 4,3 | 3,3 | 3,3 | 2,7 |
| | 70-74 ans | 4 | 4,5 | 3,6 | 5,5 | 4,1 | 3,7 | 3,2 |
| | 50-74 ans | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 3,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
| | 50-74 ans ** | 3 | 3,3 | 2,8 | . | . | . | . |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 99,2 | 98,4 | 100 | 98,1 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 99,2 | 100 | 98,4 | 100 | 100 | 100 | 97 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 98,4 | 98,5 | 98,3 | 100 | 96,2 | 97,1 | 100 |
| | 70-74 ans | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 100 | 100 | 97,6 | 97,7 |
| | 50-74 ans | 99,2 | 99,1 | 99,2 | 99,5 | 99,5 | 98,6 | 98,9 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 89,2 | 85,5 | 92,6 | 82,7 | 92,2 | 100 | 94,1 |
| | 55-59 ans | 95,2 | 96,8 | 93,5 | 97,4 | 93,3 | 95,8 | 93,8 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 93,9 | 93,7 | 94,1 | 91,1 | 90,9 | 97,1 | 96,6 |
| | 65-69 ans | 91,7 | 85,9 | 98,2 | 74,2 | 96 | 97 | 100 |
| | 70-74 ans | 91,6 | 92,7 | 90,6 | 95,2 | 88,1 | 90 | 93 |
| | 50-74 ans | 92,4 | 91,1 | 93,6 | 88,5 | 91,7 | 95 | 95,6 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 98,3 | 100 | 96,8 | 100 | 95,7 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 97,6 | 98,6 | 96,9 | 100 | 100 | 97 | 94,6 |
| | 65-69 ans | 99,1 | 98,2 | 100 | 100 | 100 | 96,9 | 100 |
| | 70-74 ans | 96,1 | 94,7 | 97,4 | 92,5 | 94,6 | 97,2 | 100 |
| | 50-74 ans | 98,1 | 98,1 | 98 | 98,4 | 97,7 | 97,8 | 98,3 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 72 | 71 | 72 | 63 | 78 | 106 | 56 |
| | 55-59 ans | 70 | 70 | 71 | 74 | 75 | 63 | 66 |
| | 60-64 ans | 70 | 75 | 67 | 73 | 62 | 77 | 70 |
| | 65-69 ans | 80 | 83 | 77 | 110 | 92 | 63 | 65 |
| | 70-74 ans | 68 | 62 | 73 | 58 | 69 | 68 | 76 |
| | 50-74 ans | 72 | 72 | 71 | 72 | 74 | 71 | 69 |
| C03- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 9,9 | 14,3 | 5,9 | 17 | 5,9 | 0 | 5,9 |
| | 55-59 ans | 4 | 1,6 | 6,3 | 2,6 | 6,7 | 0 | 6,1 |
| | 60-64 ans | 5 | 5,1 | 4,9 | 6,7 | 6,8 | 2,9 | 3,4 |
| | 65-69 ans | 6,5 | 10,8 | 1,7 | 19,4 | 3,8 | 2,9 | 0 |
| | 70-74 ans | 5,3 | 3,6 | 7 | 2,4 | 9,5 | 4,9 | 4,5 |
| | 50-74 ans | 6 | 6,8 | 5,3 | 9,6 | 6,7 | 2,8 | 3,8 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 99,1 | 100 | 98,4 | 100 | 97,9 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 98,8 | 98,6 | 99 | 100 | 100 | 97 | 98,2 |
| | 65-69 ans | 99,1 | 98,2 | 100 | 100 | 100 | 96,9 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 100 | 99,4 | 98,5 | 99,4 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 61,2 | 54,7 | 66,7 | 51,2 | 66 | 70 | 68,8 |
| | 55-59 ans | 51,7 | 45 | 58,6 | 43,2 | 60,7 | 47,8 | 56,7 |
| | 60-64 ans | 51,8 | 40,5 | 60,4 | 34,1 | 60 | 48,5 | 60,7 |
| | 65-69 ans | 51,4 | 47,3 | 55,4 | 52,2 | 54,2 | 43,8 | 56,3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 44,8 | 32,5 | 57,1 | 30 | 59,5 | 35,1 | 55 |
| | 50-74 ans | 51,7 | 42,9 | 59,7 | 41,3 | 60,8 | 45,2 | 58,6 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 8,6 | 7,5 | 9,5 | 7 | 10,6 | 10 | 6,3 |
| | 55-59 ans | 6,8 | 5 | 8,6 | 5,4 | 10,7 | 4,3 | 6,7 |
| | 60-64 ans | 6,5 | 6,8 | 6,3 | 7,3 | 7,5 | 6,1 | 5,4 |
| | 65-69 ans | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 0 | 0 | 9,4 | 9,4 |
| | 70-74 ans | 4,5 | 5,2 | 3,9 | 10 | 8,1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 6,3 | 6 | 6,6 | 6,5 | 8 | 5,2 | 5,2 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0,9 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 0 | 3,4 | 0 | 3,6 | 0 | 3,3 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 1,4 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,9 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 3,1 |
| | 70-74 ans | 1,9 | 1,3 | 2,6 | 0 | 2,7 | 2,7 | 2,5 |
| | 50-74 ans | 1,2 | 0,6 | 1,7 | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 2,3 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 10,3 | 13,2 | 7,9 | 16,3 | 6,4 | 0 | 12,5 |
| | 55-59 ans | 10,2 | 15 | 5,2 | 13,5 | 3,6 | 17,4 | 6,7 |
| | 60-64 ans | 16,5 | 25,7 | 9,4 | 24,4 | 5 | 27,3 | 12,5 |
| | 65-69 ans | 9,9 | 9,1 | 10,7 | 8,7 | 8,3 | 9,4 | 12,5 |
| | 70-74 ans | 14,3 | 19,5 | 9,1 | 17,5 | 10,8 | 21,6 | 7,5 |
| | 50-74 ans | 12,7 | 17,2 | 8,6 | 16,8 | 6,8 | 17,8 | 10,3 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 12,9 | 15,1 | 11,1 | 16,3 | 12,8 | 10 | 6,3 |
| | 55-59 ans | 16,1 | 21,7 | 10,3 | 21,6 | 7,1 | 21,7 | 13,3 |
| | 60-64 ans | 13,5 | 17,6 | 10,4 | 26,8 | 15 | 6,1 | 7,1 |
| | 65-69 ans | 25,2 | 30,9 | 19,6 | 34,8 | 29,2 | 28,1 | 12,5 |
| | 70-74 ans | 16,2 | 14,3 | 18,2 | 15 | 16,2 | 13,5 | 20 |
| | 50-74 ans | 16,4 | 19,4 | 13,7 | 21,7 | 15,3 | 16,3 | 12,1 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 3,4 | 5,7 | 1,6 | 4,7 | 2,1 | 10 | 0 |
| | 55-59 ans | 6,8 | 8,3 | 5,2 | 8,1 | 3,6 | 8,7 | 6,7 |
| | 60-64 ans | 8,2 | 6,8 | 9,4 | 4,9 | 7,5 | 9,1 | 10,7 |
| | 65-69 ans | 2,7 | 3,6 | 1,8 | 4,3 | 0 | 3,1 | 3,1 |
| | 70-74 ans | 14,9 | 22,1 | 7,8 | 25 | 2,7 | 18,9 | 12,5 |
| | 50-74 ans | 7,8 | 10 | 5,7 | 9,8 | 3,4 | 10,4 | 8 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0,9 | 1,9 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|---------------------|------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 1,7 | 0 | 3,4 | 0 | 3,6 | 0 | 3,3 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,9 | 0 | 1,8 | 0 | 4,2 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,6 | 1,3 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 0 | 0,6 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 5,4 | 7,1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,2 | 0 | 2,1 | 0 | 2,5 | 0 | 1,8 |
| | 65-69 ans | 1,8 | 0 | 3,6 | 0 | 4,2 | 0 | 3,1 |
| | 70-74 ans | 2,6 | 3,9 | 1,3 | 0 | 0 | 8,1 | 2,5 |
| | 50-74 ans | 1,8 | 1,6 | 2 | 1,1 | 2,3 | 2,2 | 1,7 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0,9 | 0 | 1,6 | 0 | 2,1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,2 | 1,4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,8 |
| | 65-69 ans | 0,9 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | 1,5 | 0,6 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 5,3 | 6,5 | 4,4 | 8,1 | 4,6 | 1,7 | 3,9 |
| | 55-59 ans | 6,7 | 10,8 | 3,5 | 12,4 | 2,3 | 9,2 | 4,7 |
| | 60-64 ans | 8,4 | 12,1 | 5,6 | 17,7 | 5,4 | 7,5 | 5,7 |
| | 65-69 ans | 10,5 | 12,6 | 8,6 | 13,9 | 11,6 | 11,8 | 6,6 |
| | 70-74 ans | 11 | 14 | 8,8 | 17,1 | 9,7 | 11,8 | 8,1 |
| | 50-74 ans | 8,2 | 11,1 | 5,9 | 13,1 | 5,9 | 9 | 6 |
| | 50-74 ans ** | 8,1 | 10,7 | 5,7 | . | . | . | . |
| D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3 | 3,5 | 2,5 | 4,1 | 3 | 1,7 | 1,3 |
| | 55-59 ans | 4,1 | 6,4 | 2,3 | 7,6 | 1,5 | 5,1 | 3,1 |
| | 60-64 ans | 3,8 | 4,9 | 2,9 | 9,3 | 4 | 1,4 | 2,1 |
| | 65-69 ans | 7,5 | 9,8 | 5,5 | 11,1 | 9 | 8,8 | 3,3 |
| | 70-74 ans | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 7,9 | 5,8 | 4,5 | 5,9 |
| | 50-74 ans | 4,6 | 5,9 | 3,7 | 7,4 | 4,1 | 4,3 | 3,2 |
| | 50-74 ans ** | 4,6 | 5,8 | 3,5 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 1,7 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 2,5 | 1,2 | 2,9 | 0,8 | 2 | 1,6 |
| | 60-64 ans | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 1,7 | 2 | 2,1 | 3,1 |
| | 65-69 ans | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 1,4 | 0 | 1 | 0,8 |
| | 70-74 ans | 5,4 | 9,1 | 2,5 | 13,2 | 1 | 6,3 | 3,7 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 2,2 | 3 | 1,5 | 3,3 | 0,9 | 2,7 | 2,1 |
| | 50-74 ans ** | 2 | 2,7 | 1,4 | . | . | . | . |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des