

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	22584	10515	12069	5988	6614	4527	5455
	55-59 ans	20734	9514	11220	1655	1739	7859	9481
	60-64 ans	19353	8839	10514	1273	1319	7566	9195
	65-69 ans	15050	6736	8314	835	922	5901	7392
	70-74 ans	15493	6802	8691	708	900	6094	7791
	50-74 ans	93214	42406	50808	10459	11494	31947	39314
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	514	223	291	158	193	65	98
	55-59 ans	501	214	287	75	73	139	214
	60-64 ans	535	228	307	66	70	162	237
	65-69 ans	422	158	264	39	59	119	205
	70-74 ans	464	168	296	44	57	124	239
	50-74 ans	2436	991	1445	382	452	609	993
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	366	163	203	111	125	52	78
	55-59 ans	351	154	197	50	37	104	160
	60-64 ans	417	178	239	40	46	138	193
	65-69 ans	332	126	206	29	35	97	171
	70-74 ans	338	117	221	22	32	95	189
	50-74 ans	1804	738	1066	252	275	486	791
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	148	60	88	47	68	13	20
	55-59 ans	150	60	90	25	36	35	54
	60-64 ans	118	50	68	26	24	24	44
	65-69 ans	90	32	58	10	24	22	34
	70-74 ans	126	51	75	22	25	29	50
	50-74 ans	632	253	379	130	177	123	202
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	22436	10455	11981	5941	6546	4514	5435
	55-59 ans	20584	9454	11130	1630	1703	7824	9427
	60-64 ans	19235	8789	10446	1247	1295	7542	9151
	65-69 ans	14960	6704	8256	825	898	5879	7358
	70-74 ans	15367	6751	8616	686	875	6065	7741
	50-74 ans	92582	42153	50429	10329	11317	31824	39112
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	419	207	212	126	116	81	96
	55-59 ans	426	215	211	49	33	166	178
	60-64 ans	458	251	207	54	28	197	179
	65-69 ans	394	216	178	37	31	179	147
	70-74 ans	430	235	195	34	31	201	164
	50-74 ans	2127	1124	1003	300	239	824	764
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	410	204	206	124	111	80	95
	55-59 ans	419	214	205	48	31	166	174
	60-64 ans	447	247	200	52	26	195	174
	65-69 ans	381	209	172	37	30	172	142
	70-74 ans	416	226	190	31	30	195	160
	50-74 ans	2073	1100	973	292	228	808	745
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	374	187	187	115	101	72	86
	55-59 ans	393	205	188	45	26	160	162
	60-64 ans	426	236	190	49	23	187	167
	65-69 ans	361	201	160	34	29	167	131
	70-74 ans	381	207	174	25	28	182	146
	50-74 ans	1935	1036	899	268	207	768	692
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	353	178	175	111	95	67	80
	55-59 ans	370	193	177	41	26	152	151
	60-64 ans	392	215	177	44	22	171	155
	65-69 ans	327	181	146	31	26	150	120
	70-74 ans	347	191	156	25	26	166	130

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1789	958	831	252	195	706	636
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	4	2	2	1	0	1	2
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	12	5	7	1	1	4	6
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	6	1	5	1	1	0	4
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	366	186	180	115	97	71	83
	55-59 ans	385	203	182	44	26	159	156
	60-64 ans	412	227	185	47	23	180	162
	65-69 ans	351	197	154	34	29	163	125
	70-74 ans	370	205	165	25	26	180	139
	50-74 ans	1884	1018	866	265	201	753	665
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	8	1	7	0	4	1	3
	55-59 ans	8	2	6	1	0	1	6
	60-64 ans	14	9	5	2	0	7	5
	65-69 ans	10	4	6	0	0	4	6
	70-74 ans	11	2	9	0	2	2	7
	50-74 ans	51	18	33	3	6	15	27
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	1	0	2
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	15	6	9	2	3	4	6
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	374	187	187	115	101	72	86
	55-59 ans	393	205	188	45	26	160	162
	60-64 ans	425	236	189	49	23	187	166
	65-69 ans	361	201	160	34	29	167	131
	70-74 ans	381	207	174	25	28	182	146
	50-74 ans	1934	1036	898	268	207	768	691
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	374	187	187	115	101	72	86
	55-59 ans	396	205	191	45	27	160	164
	60-64 ans	430	238	192	50	23	188	169
	65-69 ans	366	204	162	35	30	169	132
	70-74 ans	384	208	176	25	29	183	147
	50-74 ans	1950	1042	908	270	210	772	698
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	228	95	133	64	69	31	64
	55-59 ans	207	89	118	22	14	67	104
	60-64 ans	230	107	123	14	12	93	111
	65-69 ans	178	82	96	16	14	66	82
	70-74 ans	174	76	98	6	18	70	80
	50-74 ans	1017	449	568	122	127	327	441
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	16	10	6	5	4	5	2
	55-59 ans	17	11	6	1	0	10	6
	60-64 ans	13	4	9	1	2	3	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	11	4	7	0	1	4	6
	70-74 ans	11	7	4	0	1	7	3
	50-74 ans	68	36	32	7	8	29	24
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	17	9	8	5	5	4	3
	55-59 ans	27	17	10	6	1	11	9
	60-64 ans	22	14	8	5	1	9	7
	65-69 ans	16	9	7	0	1	9	6
	70-74 ans	11	6	5	2	2	4	3
	50-74 ans	93	55	38	18	10	37	28
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	28	16	12	10	8	6	4
	55-59 ans	31	16	15	2	4	14	11
	60-64 ans	45	27	18	6	2	21	16
	65-69 ans	26	16	10	1	4	15	6
	70-74 ans	41	24	17	2	0	22	17
	50-74 ans	171	99	72	21	18	78	54
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	64	41	23	22	11	19	12
	55-59 ans	83	58	25	10	7	48	18
	60-64 ans	72	54	18	13	2	41	16
	65-69 ans	89	59	30	13	6	46	24
	70-74 ans	96	62	34	8	6	54	28
	50-74 ans	404	274	130	66	32	208	98
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	13	10	3	5	2	5	1
	55-59 ans	21	12	9	3	0	9	9
	60-64 ans	36	25	11	9	2	16	9
	65-69 ans	35	26	9	5	2	21	7
	70-74 ans	38	25	13	4	2	21	11
	50-74 ans	143	98	45	26	8	72	37
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8	6	2	4	2	2	0
	55-59 ans	9	2	7	1	1	1	6
	60-64 ans	11	6	5	1	2	5	3
	65-69 ans	8	6	2	0	2	6	0
	70-74 ans	12	7	5	3	0	4	5
	50-74 ans	48	27	21	9	7	18	14
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	92	57	35	32	19	25	16
	55-59 ans	114	74	40	12	11	62	29
	60-64 ans	117	81	36	19	4	62	32
	65-69 ans	115	75	40	14	10	61	30
	70-74 ans	137	86	51	10	6	76	45
	50-74 ans	575	373	202	87	50	286	152
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	64	41	23	22	11	19	12

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	83	58	25	10	7	48	18
	60-64 ans	72	54	18	13	2	41	16
	65-69 ans	89	59	30	13	6	46	24
	70-74 ans	96	62	34	8	6	54	28
	50-74 ans	404	274	130	66	32	208	98
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	13	10	3	5	2	5	1
	55-59 ans	21	12	9	3	0	9	9
	60-64 ans	36	25	11	9	2	16	9
	65-69 ans	35	26	9	5	2	21	7
	70-74 ans	38	25	13	4	2	21	11
	50-74 ans	143	98	45	26	8	72	37
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	10	3	5	2	5	1
	55-59 ans	18	11	7	3	0	8	7
	60-64 ans	33	24	9	9	2	15	7
	65-69 ans	30	21	9	4	2	17	7
	70-74 ans	32	21	11	4	2	17	9
	50-74 ans	126	87	39	25	8	62	31
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	13	10	3	5	2	5	1
	55-59 ans	17	11	6	3	0	8	6
	60-64 ans	33	24	9	9	2	15	7
	65-69 ans	30	21	9	4	2	17	7
	70-74 ans	31	20	11	3	2	17	9
	50-74 ans	124	86	38	24	8	62	30
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	9	7	2	3	1	4	1
	55-59 ans	14	10	4	3	0	7	4
	60-64 ans	25	17	8	6	2	11	6
	65-69 ans	25	17	8	3	2	14	6
	70-74 ans	24	15	9	3	2	12	7
	50-74 ans	97	66	31	18	7	48	24
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	8	7	1	3	0	4	1
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	50-74 ans	27	20	7	6	1	14	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	12	8	4	2	2	6	2
	65-69 ans	9	5	4	0	2	5	2
	70-74 ans	9	4	5	2	2	2	3
	50-74 ans	38	24	14	8	7	16	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	18	11	7	4	0	7	7
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	3	0	0	0	3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	7	4	3	2	0	2	3
	65-69 ans	5	5	0	0	0	5	0
	70-74 ans	8	6	2	0	0	6	2
	50-74 ans	29	22	7	3	0	19	7
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	12	9	3	3	0	6	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	13	10	3	5	2	5	1
	55-59 ans	18	11	7	3	0	8	7
	60-64 ans	33	24	9	9	2	15	7
	65-69 ans	29	21	8	4	2	17	6
	70-74 ans	30	19	11	4	2	15	9
	50-74 ans	123	85	38	25	8	60	30
A40- Perdus de vue	50-54 ans	17	10	7	6	4	4	3
	55-59 ans	8	4	4	1	2	3	2
	60-64 ans	10	6	4	2	2	4	2
	65-69 ans	6	3	3	2	0	1	3
	70-74 ans	9	5	4	3	0	2	4
	50-74 ans	50	28	22	14	8	14	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,3	2,1	2,4	2,6	2,9	1,4	1,8	
	55-59 ans	2,4	2,2	2,6	4,5	4,2	1,8	2,3	
	60-64 ans	2,8	2,6	2,9	5,2	5,3	2,1	2,6	
	65-69 ans	2,8	2,3	3,2	4,7	6,4	2	2,8	
	70-74 ans	3	2,5	3,4	6,2	6,3	2	3,1	
	50-74 ans	2,6	2,3	2,8	3,7	3,9	1,9	2,5	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,7	0,6	0,7	0,8	1	0,3	0,4	
	55-59 ans	0,7	0,6	0,8	1,5	2,1	0,4	0,6	
	60-64 ans	0,6	0,6	0,6	2	1,8	0,3	0,5	
	65-69 ans	0,6	0,5	0,7	1,2	2,6	0,4	0,5	
	70-74 ans	0,8	0,7	0,9	3,1	2,8	0,5	0,6	
	50-74 ans	0,7	0,6	0,7	1,2	1,5	0,4	0,5	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,2	73,1	69,8	70,3	64,8	80	79,6	
	55-59 ans	70,1	72	68,6	66,7	50,7	74,8	74,8	
	60-64 ans	77,9	78,1	77,9	60,6	65,7	85,2	81,4	
	65-69 ans	78,7	79,7	78	74,4	59,3	81,5	83,4	
	70-74 ans	72,8	69,6	74,7	50	56,1	76,6	79,1	
	50-74 ans	74,1	74,5	73,8	66	60,8	79,8	79,7	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2	1,8	2,1	1,8	1,8	1,8	
	55-59 ans	2,1	2,3	1,9	3	1,9	2,1	1,9	
	60-64 ans	2,4	2,9	2	4,3	2,2	2,6	2	
	65-69 ans	2,6	3,2	2,2	4,5	3,5	3	2	
	70-74 ans	2,8	3,5	2,3	5	3,5	3,3	2,1	
	50-74 ans	2,3	2,7	2	2,9	2,1	2,6	2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,9	98,6	97,2	98,4	95,7	98,8	99	
	55-59 ans	98,4	99,5	97,2	98	93,9	100	97,8	
	60-64 ans	97,6	98,4	96,6	96,3	92,9	99	97,2	
	65-69 ans	96,7	96,8	96,6	100	96,8	96,1	96,6	
	70-74 ans	96,7	96,2	97,4	91,2	96,8	97	97,6	
	50-74 ans	97,5	97,9	97	97,3	95,4	98,1	97,5	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,2	91,7	90,8	92,7	91	90	90,5	
	55-59 ans	93,8	95,8	91,7	93,8	83,9	96,4	93,1	
	60-64 ans	95,3	95,5	95	94,2	88,5	95,9	96	
	65-69 ans	94,8	96,2	93	91,9	96,7	97,1	92,3	
	70-74 ans	91,6	91,6	91,6	80,6	93,3	93,3	91,3	
	50-74 ans	93,3	94,2	92,4	91,8	90,8	95	92,9	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,4	95,2	93,6	96,5	94,1	93,1	93	
	55-59 ans	94,1	94,1	94,1	91,1	100	95	93,2	
	60-64 ans	92	91,1	93,2	89,8	95,7	91,4	92,8	
	65-69 ans	90,6	90	91,3	91,2	89,7	89,8	91,6	
	70-74 ans	91,1	92,3	89,7	100	92,9	91,2	89	
	50-74 ans	92,5	92,5	92,4	94	94,2	91,9	91,9	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85	81	90	89	103	68	75	
	55-59 ans	83	81	84	79	102	82	81	
	60-64 ans	80	83	76	82	69	83	77	
	65-69 ans	86	92	78	99	81	90	78	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	79	80	77	68	78	82	76
	50-74 ans	82	83	81	85	93	83	78
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,1	4,8	3,3	4,8	3,4	4,9	3,1
	55-59 ans	1,9	1,9	1,9	2	6,1	1,8	1,1
	60-64 ans	2,2	2,4	1,9	3,7	7,1	2	1,1
	65-69 ans	1,5	1,4	1,7	5,4	0	0,6	2
	70-74 ans	2,1	2,1	2,1	8,8	0	1	2,4
	50-74 ans	2,4	2,5	2,2	4,7	3,3	1,7	1,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,8	100	99,5	100	100	100	99,4
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,9	100	99,9	100	100	100	99,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61	50,8	71,1	55,7	68,3	43,1	74,4
	55-59 ans	52,3	43,4	61,8	48,9	51,9	41,9	63,4
	60-64 ans	53,5	45	64,1	28	52,2	49,5	65,7
	65-69 ans	48,6	40,2	59,3	45,7	46,7	39,1	62,1
	70-74 ans	45,3	36,5	55,7	24	62,1	38,3	54,4
	50-74 ans	52,2	43,1	62,6	45,2	60,5	42,4	63,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,3	5,3	3,2	4,3	4	6,9	2,3
	55-59 ans	4,3	5,4	3,1	2,2	0	6,3	3,7
	60-64 ans	3	1,7	4,7	2	8,7	1,6	4,1
	65-69 ans	3	2	4,3	0	3,3	2,4	4,5
	70-74 ans	2,9	3,4	2,3	0	3,4	3,8	2
	50-74 ans	3,5	3,5	3,5	2,6	3,8	3,8	3,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	4,5	4,8	4,3	4,3	5	5,6	3,5
	55-59 ans	6,8	8,3	5,2	13,3	3,7	6,9	5,5
	60-64 ans	5,1	5,9	4,2	10	4,3	4,8	4,1
	65-69 ans	4,4	4,4	4,3	0	3,3	5,3	4,5
	70-74 ans	2,9	2,9	2,8	8	6,9	2,2	2
	50-74 ans	4,8	5,3	4,2	6,7	4,8	4,8	4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,5	8,6	6,4	8,7	7,9	8,3	4,7
	55-59 ans	7,8	7,8	7,9	4,4	14,8	8,8	6,7
	60-64 ans	10,5	11,3	9,4	12	8,7	11,2	9,5
	65-69 ans	7,1	7,8	6,2	2,9	13,3	8,9	4,5
	70-74 ans	10,7	11,5	9,7	8	0	12	11,6
	50-74 ans	8,8	9,5	7,9	7,8	8,6	10,1	7,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17,1	21,9	12,3	19,1	10,9	26,4	14
	55-59 ans	21	28,3	13,1	22,2	25,9	30	11
	60-64 ans	16,7	22,7	9,4	26	8,7	21,8	9,5
	65-69 ans	24,3	28,9	18,5	37,1	20	27,2	18,2
	70-74 ans	25	29,8	19,3	32	20,7	29,5	19
	50-74 ans	20,7	26,3	14,3	24,4	15,2	26,9	14
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	5,3	1,6	4,3	2	6,9	1,2
	55-59 ans	5,3	5,9	4,7	6,7	0	5,6	5,5
	60-64 ans	8,4	10,5	5,7	18	8,7	8,5	5,3
	65-69 ans	9,6	12,7	5,6	14,3	6,7	12,4	5,3
	70-74 ans	9,9	12	7,4	16	6,9	11,5	7,5
	50-74 ans	7,3	9,4	5	9,6	3,8	9,3	5,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0	0,5	0	0	0	0,6
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,5	0,5	0,6	0	0	0,6	0,8
	70-74 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,5	0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,2	0	0	0,3	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,1	3,2	1,1	3,5	2	2,8	0
	55-59 ans	2,3	1	3,7	2,2	3,7	0,6	3,7
	60-64 ans	2,6	2,5	2,6	2	8,7	2,7	1,8
	65-69 ans	2,2	2,9	1,2	0	6,7	3,6	0
	70-74 ans	3,1	3,4	2,8	12	0	2,2	3,4
	50-74 ans	2,5	2,6	2,3	3,3	3,3	2,3	2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,2	0,4	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,6	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0,4	0	0,1	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	5,5	2,9	5,4	2,9	5,5	2,9
	55-59 ans	5,5	7,8	3,6	7,4	6,5	7,9	3,1
	60-64 ans	6,1	9,2	3,4	15,2	3,1	8,2	3,5
	65-69 ans	7,7	11,2	4,8	17	11,1	10,4	4,1
	70-74 ans	8,9	12,7	5,9	14,6	6,9	12,5	5,8
	50-74 ans	6,2	8,8	4	8,4	4,4	9	3,9
	50-74 ans **	6,2	8,7	3,9
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	3,9	1,9	3,7	1,7	4,2	2,2
	55-59 ans	4	6,1	2,2	6,1	4,1	6,1	1,9
	60-64 ans	3,7	6,1	1,7	10,4	1,5	5,4	1,7
	65-69 ans	5,9	8,8	3,6	15,8	6,7	7,8	3,3
	70-74 ans	6,2	9,2	3,9	11,7	6,9	8,9	3,6
	50-74 ans	4,4	6,5	2,6	6,4	2,8	6,5	2,5
	50-74 ans **	4,4	6,4	2,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1	0,3	0,8	0,3	1,1	0,2
	55-59 ans	1	1,3	0,8	1,8	0	1,2	1
	60-64 ans	1,9	2,8	1,1	7,2	1,5	2,1	1
	65-69 ans	2,3	3,9	1,1	6,1	2,2	3,6	1
	70-74 ans	2,5	3,7	1,5	5,8	2,3	3,5	1,4
	50-74 ans	1,5	2,3	0,9	2,5	0,7	2,3	0,9
	50-74 ans **	1,5	2,2	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5,6	0	14,3	0	0	0	14,3
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3,1	4,8	0	25	0	0	0
	50-74 ans	1,6	1,1	2,6	4	0	0	3,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des